FAST-5% **ФЭСТ-5%** **ИНСЕКТИЦИД** **КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ**

Класс:
Пиретроиды

Широкого спектра пиретроидальный инсектицид, в качестве активного ингредиента представлен ЭСФЕНВАЛЕРАТ.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ЭСФЕНВАЛЕРАТ

5% вес / объем
(активного вещества)

СВОЙСТВА:

ФЭСТ-5%: Содержит ЭСФЕНВАЛЕРАТ, который высокоэффективен против сельскохозяйственных насекомых.

ФЭСТ-5%: активен против насекомых, которые устойчивы к фосфорорганическим, хлорорганическим и карбаматным соединениям.

ФЭСТ-5%: эффективен против жесткокрылых, полужесткокрылых, двукрылых, чешуекрылых и прямокрылых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры	Плодовый червь	3 - 8	1
Капуста	Гусеница озимой совки		3
Огурцы	Тля		3
Мускусная дыня	Белокрылки		3
Картофель, баклажан	Трипсы, зеленая персиковая тля, клорадский жук	5 - 8	7
Морковь	Гусеница озимой совки, цикадки	22 - 37	7
Брокколи	Пяденица люцерновая, капустная пяденица, гусеница озимой совки, блошки, кузнечик	22 - 37	3

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

Яблони	Листоблошка.	6 – 8	21
	Мохнатая тля.	4 - 5	
Персик, миндаль, абрикосы	Плодовая муха, точильщики.	4 – 6	21
Сахарная свекла	Капустная моль, гусеница озимой совки, тля	4 - 6	21
	Блошка гречишная, клоп свекольный	4 - 6	
Сахарный тростник	Точильщик сахарного тростника	22 - 37	21
Горох, фасоль	Гороховая плодоярка, гороховая тля, черная свеколовичная тля, долгоносик, гороховый трипс	4 - 6	3
	Гороховый долгоносик	3 – 4	
Злаки	Черви	6 – 8	1
	Тля	2 - 4	
	Черепашка вредная	4 - 6	
	Зерновой жук	2 - 5	
Кукуруза	Гусеница хлопковой совки	4 - 6	----
	Кукурузный мотылек, плодовая муха	6 - 8	
Сорго	Тля	5	---
Соя	Зеленая нусеница огневки сенной, мексиканский бобовый жук, картофельная цикадка, солончаковая гусеница, бобовая совка, волосатая гусеница	22 - 37	21
	Бобовый листоед, капстная пяденица, гусеница хлопковой совки, гусеница озимой совки, кузнечики, южный щитник, трехугольная люцерновая цикадка	22 - 37	
Арахис	Гусеница хлопковой совки, картофельная цикадка, красношей арахисовый червь, бобовая совка	11 - 22	21
	Гусеница озимой совки, кузнечики	22 - 37	
	Черная гусеница озимой совки, земляные клопы, гусеница озимой совки	22 - 37	
Орех-пекан	Тля, ореховая листовая филлоксера, стеблевая филлоксера, долгоносик	19 - 57	21

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Грецкие орехи	Плодожорка, апельсиновый рубчиковый червь, тля, муха скорлупы	37 - 75	21
Артишок	Пальцекрылка	22 - 37	1
Хлопок	Американская хлопковая совка, хлопковая совка, табачный бутонный червь, колючая совки, пятнистая совки, гусеница озимой совки, хлопковый листовой червь	7.5 - 12	21
	Тля	6 - 10	
	Белокрылки, цикадки, хлопковый джассид, хлопковый долгоносик, трипсы	10 - 12	
Масличный рапс	Капустный стеблевой долгоносик, рапсовый стеблевой долгоносик, скрытнохоботник корневой капустный, капустный семенной долгоносик, реповые блошки, малые полосатые блошки, большие полосатые блошки, галлица капустная	4 - 6	-----
	Пилильщик рапсовый	2 - 4	

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

72 часа после последнего лечения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: FAST – 7.5% ULV.**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.