

FENIKILL-30%

ФЕНИКИЛ-30%

Класс:
Органофосфаты⁽¹⁾
Пиретроиды⁽²⁾

ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Специальная комбинация инсектицида используется в борьбе с различными насекомыми-вредителями.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ФЕНИТРОТИОН ⁽¹⁾	25% мас. / объем (активного вещества)
ФЕНВАЛЕРАТ ⁽²⁾	5% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ФЕНИКИЛ - 30%: специальная комбинация ФЕНВАЛЕРАТА и ФЕНИТРОТИОНА, используемая для контроля грызущих и сосущих насекомых.

ФЕНИКИЛ - 30%: высокоэффективен против атак чешуекрылых, двукрылых и жесткокрылых на полевых культурах, фруктовых деревьях и овощах.

ФЕНИКИЛ - 30%: не фитотоксичен если следовать рекомендациям, но при высокой дозировке может привести к травмам у крестоцветных и фруктовых культур.

ФЕНИКИЛ - 30%: оказывает контактное и желудочное действие, проникает в ткани растений.

ФЕНИКИЛ - 30%: высокоэффективен против личиночной, нимфальной и взрослой стадий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСН ЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Капуста, цветная капуста, картофель, помидоры, лук, чеснок, кабачок, фасоль, мускусная дыня, арбузы.	Гусеницы, жуки, трипсы, тля.	30 - 45	15
Виноград, цитрус, яблоко, груша,	Плодожорка, листовертка, плодовая моль, плодовая	40 - 50	15

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

персик, слива, абрикос, нектарин и миндаль.	муха, гусеницы, жуки, виноградная листовёртка, минеры, мучнистый червец.		
Пшеница	Пшеничные клопы, гусеница озимой совки, тля, галлицы.	40 - 50	15
Кукуруза	Кукурузный точильщик	30 - 45	15

ВНИМАНИЕ: Использовать только на вышеуказанных культурах и соблюдать рекомендуемый безопасный период до сбора урожая.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: через 24 часа после последнего применения.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ:

- Не фитотоксичен при использовании в соответствии с рекомендациями. При использовании высоких доз препарата могут получить травмы хлопок, капуста и некоторые фруктовые культуры.
- У некоторых сортов яблонь может возникнуть побурение плодов.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством пестицидов, кроме бенабакрильной группы и щелочных соединений.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА:**

FENIKILL - 99.5% ULV (FENITROTHION 99% + FENVALERATE 0.5%).

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.