

FERRIKING ФЕРРИКИНГ

Класс:
Микроудобрение

РАСТИТЕЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА / РАСТВОРИМЫЕ ГРАНУЛЫ

Высокоэффективное микроудобрение, используемое для компенсации дефицита железа в растениях.

СОСТАВ: Каждый килограмм содержит:

ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА

**6% (Железо в виде FeEDDHA)
(Содержание железа в Ortho-Ortho 70%)**

СВОЙСТВА:

ФЕРРИКИНГ: Хелат железа в форме Fe-EDDHA является высокоэффективным средством, которое используют для компенсации дефицита железа в растениях.

ФЕРРИКИНГ: Легко впитывается растениями.

ФЕРРИКИНГ: Можно использовать для корневой и внекорневой подкормки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

1- Корневая подкормка:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	ПРИМЕНЕНИЕ
Фруктовые деревья: (Цитрусовые, косточковые, семечковые и оливковые).	100 – 250 г / дерево	Применять в конце периода покоя, но достаточно рано, чтобы зимние дожди вымыли ФЕРРИКИНГ в корневую зону.
- Большие деревья	50 – 200 г / дерево	
- Малые деревья	25 – 100 г / дерево	
Виноград	500 – 1000 г / 1000 м ² (10 – 20 г / дерево)	Нанесить в виде спрея между рядами растений и культивировать в почве.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

		ФЕРРИКИНГ может применяться при капельном орошении.
Овощи	500 г / 1000 м ²	Применять до посадки.
Однолетние и многолетние декоративные растения.	5 - 15 г / растение	Разбавить соответствующим количеством воды, затем распылить вокруг основания растения и немедленно оросить.
Саженцы (в питомниках)	8 г / м ²	Разбавить соответствующим количеством воды, затем распылить вокруг основания растения и немедленно оросить.
Газоны	2 - 5 г / м ²	

2- Капельное орошение:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	ПРИМЕНЕНИЕ
Фруктовые деревья: (Цитрусовые, косточковые, семечковые и оливковые).	100 г / 100 л воды	Требуется тщательное покрытие.
Овощи	150 г / 1000 м ²	Применять в начале вегетационного периода, как только культуры имеют достаточное количество листьев для поглощения спрея.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

- При нанесении на почву: препарат следует включать в почву путем культивирования или промывания до корневой зоны орошением.
- При нанесении с помощью капельного орошения количество воды не должно быть менее 50 л / 1000 м².
- **ФЕРРИКИНГ** можно применять более одного раза, в зависимости от размера растения и дефицита железа в почве.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с пестицидами и удобрениями.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.