

FLORATONE-SP ФЛОРАТОН-РП

Класс:
Синтетические
ауксины^{(1) (2)}

РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ РАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК

ФЛОРАТОН-РП является регулятором роста растений, способствует повышению плодородия и стимулирует рост растений.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

АЛЬФА-НАФТИЛ УКСУСНАЯ КИСЛОТА ⁽¹⁾	4,5 г (активного вещества)
АЛЬФА-НАФТИЛ АЦЕТАМИД ⁽²⁾	12.5 г (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ФЛОРАТОН-РП: представляет собой смесь регуляторов роста растений из семейства ауксина, который увеличивает плоды и улучшает урожайность.

ФЛОРАТОН-РП: Увеличивает действие других гормонов растений, которые улучшают здоровье и продуктивность растений.

ФЛОРАТОН-РП: При правильном использовании защищает растения от мороза и высокой температуры.

ФЛОРАТОН-РП: Совместим с большинством пестицидов и листовых удобрений, кроме щелочных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА мл / 100 л ВОДЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Фруктовые деревья: Яблоки, груши, персики, сливы, нектарин, абрикос.	60 мл	Применять спрей в течение двух недель до цветения и повторно применять 2-3 раза каждые 10-12 дней; последнее применение осуществлять на стадии падения лепестков.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

	60 мл	Чтобы защитить плодовые деревья от мороза на стадии цветения, применять до увядания цветков от мороза.
Овощи: Помидор, кабачки, перец, баклажаны, арбуз, мускусная дыня, горох, фасоль, клубника.	60 мл	Распылять до цветения, повторять процедуру каждые 10 дней.
	60 мл	Способствует росту растений путем его применения на стадии образования двух-трех листьев или через 10-15 дней после пересадки.

БЕЗОПАСНОСНЫЙ ПЕРИОД: 8-12 дней, собирать урожай через 20 дней после обработки.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Не изменять скорость обработки и не увеличивать ее, поскольку эффект гормонов зависит от разницы в скорости подачи препарата.
- Не распылять при высоких температурах.
- Необходимо обрабатывать все части растений.
- Действие ФЛОРАТОН-р.п. зависит от условий окружающей среды.
- При использовании ФЛОРАТОН-р.п. растения не должны находиться в стрессовых условиях.
- Не рекомендуется распылять на огурцах.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством инсектицидов, фунгицидов и листовых удобрений, несовместимых с другими регуляторами роста растений или с Бордо смесями.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.