

FOLDAN-50%

ФОЛДАН-50%

Класс:
Фталимиды

ФУНГИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Защитный фунгицид с контактным действием, эффективен в борьбе с многими грибковыми заболеваниями для широкого диапазона сельхозкультур.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ФОЛПЕТ

50% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ФОЛДАН-50%: контактный фунгицид с лечебным и защитным действием.

ФОЛДАН-50%: эффективен для контроля многих грибковых заболеваний, таких как: ложная мучнистая роса, мучнистая роса, пятнистость листьев, парша и т. д.

ФОЛДАН-50%: используется на широком ассортименте сельскохозяйственных культур, таких как семечковые деревья, косточковые деревья, цитрусовые, виноград, оливки, картофель, капуста, лук, помидоры, огурцы, баклажан и т. д.

ФОЛДАН-50%: немного токсичен для млекопитающих и других полезных насекомых или диких животных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ	БЕЗОПАСНЫ Й ПЕРИОД
Груша	Парша, пятнистость листьев, мучнистая роса	50	10	21
Яблоко		40	Каждые 14 дней	21
Цитрусовые	Антракноз, отмирание, гоммоз	60	-----	21
Виноград	Ложная мучнистая роса, мучнистая роса, бурая гниль, отмирание.	60	Каждые 14 дней	8

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Абрикос, слива, персик, миндаль	Курчавость листьев, антракноз, мучнистая роса, пятнистость листьев.	50	3	10
Кустарники (голубика, смородина, крыжовник) Полукустанник (черника, разные сорта малины)	Серая плесень, пятнистость листьев	30 - 40	Опрыскивание проводить во время цветения. Повторять с интервалом 7-14 дней от цветения до сбора урожая. Использовать более высокую концентрацию, если условия способствуют появлению инфекции.	-----
КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ	БЕЗОПАСНЫ Й ПЕРИОД
Оливки	Павлиний глаз (пятнистость), увядание	30	-----	10
Тыква	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, гниль стеблей, антракноз.	15	-----	7
Баклажаны, горох	Мучнистая роса, ранняя гниль, фитофтороз	30	-----	7
Бобовые	Мучнистая роса, пятнистость листьев	7 - 8	-----	10
Салат	Мучнистая роса, Серая плесень	40	Еженедельно	11
Мускусная дыня	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, гниль стеблей, антракноз.	40	Еженедельно	7
Арбуз	Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, гниль стеблей, антракноз.	50	1 - 2	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Лук	Розовая пятнистость, гниль.	40 - 50	2 - 3	7
Перец	Увядание, гниль стеблей, мучнистая роса.	10 - 30	3 - 4	7
Картофель	Ранняя гниль, фитофтороз	60	Еженедельно	14
Помидоры	Ранняя гниль, фитофтороз	40	Еженедельно	14
Розы	Черная пятнистость, Мучнистая роса	40	Применить через регулярные промежутки времени от начала распускания почек	-----

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых сельхозкультурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

ФИТОТОКСИЧНОСТИ:

Не фитотоксичен, за исключением: черешни, сорт груш D'Anjou и чувствительных сортов яблок, если применять на ранних этапах обрезки.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме высокощелочных соединений. Использовать продукт сразу после смешивания.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.