

GARNET-20%

ГАРНЕТ-20%

ИНСЕКТИЦИД

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

Класс:
Фенилпиразолы

Контактный и кишечный инсектицид широкого спектра действия, предназначенный для борьбы со многими сельскохозяйственными насекомыми-вредителями, такими как плодовая моль, виноградная ягодная моль, капустная совка, корневые черви, жуки, трипсы, майнеры и термиты в поле.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ФИПРОНИЛ

20% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ГРАНЕТ-20%: Контактный и кишечный инсектицид широкого спектра действия, используется для контроля насекомых вредителей сельскохозяйственных культур, таких как плодовые черви, виноградная ягодная моль, капустная совка, корневые черви, жуки, трипсы и минеры.

ГРАНЕТ-20%: Новый, эффективный инсектицид для борьбы с термитами.

ГРАНЕТ-20%: Долгое остаточное действие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Редька, цветная капуста, капуста, салат.	Капустная совка.	12.5	7
	Капустная моль.	6.25 – 25	
	Капустная пяденица.	12.5 – 25	
Баклажан	Трипсы	12.5 – 18.75	14
Виноград	Листовертка гроздевая, виноградная ягодная моль, цикадки, виноградный точильщик.	25 – 50	14
Перец	Долгоносик.	12.5	14
Картофель	Белый бахромчатый долгоносик.	25 – 75	--

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	Проволочник. Корневой червь, Картофельная цикадка. Колорадский жук. Трипсы.	50 (почвенная обработка) 50 5 – 15 12.5 – 25	
Персик, яблоко, груша.	Восточная фруктовая моль. Сливовый долгоносик, пилильщик, листовертки. Плодожорка, цикадки. Минеры, листоблошка.	25 25 – 50 25 – 100 25 – 75	14

Донум = 1000 м².

ВНИМАНИЕ: Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая.

- Для борьбы с термитами в сельском хозяйстве:

Использовать 12,5 - 25 мл / Донум следующим образом:

- Обеспечить полное покрытие путем распыления обработанной почвы перед посадкой, вспашкой и смешиванием распыляемого пестицида на глубину 5 - 10 см.
- Распылять на посадочные линии после рассады, затем покрыть почвой поверх обработанных семян.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством пестицидов, перед смешиванием необходимо провести тест на совместимость.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.