

GIBBROVAR-2% ДЖИБРОВАП-2%

Класс:
Гиббереллины

РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

ДЖИБРОВАП-2% эффективен в преодолении стадии покоя и вызывает быстрое прорастание семян, преждевременное цветение, увеличение количества фруктов, усиливает процессы роста и корнеобразования.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

ГИББЕРЕЛЛИНОВАЯ КИСЛОТА

**2% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ДЖИБРОВАП-2%: Регулятор роста растений, используемый для разрушения неактивных фаз, повышения качества сельскохозяйственных культур и их урожайности.

ДЖИБРОВАП-2%: Является гормоном, удлиняющим клетки растений.

ДЖИБРОВАП-2%: Увеличивает размер фруктов, особенно без семени, и увеличивает длину стеблей декоративных растений.

ДЖИБРОВАП-2%: Усиливает цветение у мандарина и бескосточкового винограда.

ДЖИБРОВАП-2%: Используется для разрушения неактивной фазы у картофеля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

- Для распыления использовать 200 мл / 100 л воды.
- Для разрушения неактивной фазы использовать 200 мл / 100 л воды при погружении в раствор в течение 3 минут.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

КУЛЬТУРА	ПРИМЕНЕНИЕ	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Бескосточковый виноград	Удлинение кластера.	- Перед цветением, когда кластеры составляют 4-8 см. - При 50-60% цветения.
	Увеличение размера.	При диаметре 3-4 мм.
	Получают однородные плоды.	Через неделю после третьего применения.
Изюм	Для уменьшения мощности кластера.	При 80-100% цветения.
Лемон	- Более продолжительный период для зеленых лимонов. - Контролировать время культивирования.	Перед окраской. Когда плоды достигают 75% от конечного размера. (обрабатывать за месяц до сбора урожая).
Апельсин	Увеличьте время сбора урожая и улучшите качество кожи.	За 15 дней до появления окраски (обрабатывать за 10 дней до начала сбора урожая).
Мандарин	Усиливает образование бутонов.	Во время цветения.
Груши	- Уменьшает период цветения. - Необходимо избегать вредителей и инфекций. - Увеличивает образование бутонов и урожайность.	При 25% цветения.
Картошка	- Разрыв спящей фазы для новых семян. - Активирует почкование. - Гомогенный рост. - Высокая производительность и однородные фрукты.	Перед посадкой. Окунать клубни в раствор ДЖИБРОВАП в течение 3 минут.
Клубника	Увеличение побегов и урожайности.	Через месяц после посадки саженцев.
Бананы	Увеличивает размер плодов.	- Когда стебель составляет 30-40 дней. - Через 7-15 дней после первой обработки.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Черешня	- Задержка сбора урожая. - Яркий цвет плодов. - Большие и твердые плоды.	-Когда цвет плода становится желтоватого цвета (хорошо покрывать все растение).
Срезанные цветы	- Увеличение длины и диаметра стволов. - Раннее цветение.	2-3 раза в зимний период и 1 раз перед цветением.

ПРИМЕЧАНИЯ: Использовать только рекомендованные дозы.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: ДЖИБРОВАП ТАБЛЕТКИ.**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.