

GLUSAR-20% ГЛЮСАР-20%

Класс:
Фосфинотрицины

ГЕРБИЦИД РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Контактный неселективный гербицид с некоторым системным действием; транслокация происходит только внутри листьев, преимущественно от листового основания до листьев.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

ГЛЮФОСИНАТ АММОНИЙ

**20% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ГЛЮСАР-20%: нелетучий гербицид с неселективной активностью против многих однолетних и многолетних широколистных сорняков и трав.

ГЛЮСАР-20%: видимые симптомы воздействия гербицида появляются через 3-7 дней, но полное высыхание может занять 20-30 дней при нормальных условиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	СОРНЯК	НОРМА РАСХОДА	ВНИМАНИЕ
Ягодные кустарники	Контроль побегов и отростков	500 мл / 100 л воды	Применяет в виде направленного опрыскивания побегов и отростков; контакт с развивающимися фруктами или листвой может привести к повреждению, если побеги в высоту не достигают 15 см.
Авокадо, Банан, Гуава, Киви, Манго, Папайя.	Однолетние сорняки, многолетние сорняки	1 - 5 л / Га Количество воды, используемой в: - оборудование для ручного пистолета: использовать 500-1000 л / Га при определении плотности сорняков. - Оборудование направляющего	Направленное воздействие на сорняки, не допускать опрыскивания листвы или зеленой коры; гербицид можно использовать вокруг деревьев, возраст которых менее двух лет.
Цитрусовые			
Семечковые и косточковые деревья			
Плантации орехового			

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

деревя		распылителя: использовать 300-500 л / Га при хороших условиях.	
Помидоры (междурядий)			
Клубника, тростник (междурядий)			
Виноградная лоза			

Несельскохозяй ственные районы	Однолетни е сорняки, многолетн ие сорняки	1- 6 л/Га Количество воды, используемой в: - оборудование для ручного пистолета: использовать 500-1000 л / Га при определении плотности сорняков. - Оборудование направляющего распылителя: использовать 300-500 л / Га при хороших условиях.	--
---	---	--	----

Гектар = 10000 м²

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД:

Семечковые и косточковые фрукты: 21 день, другие культуры: ---

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах с соблюдением рекомендованного безопасного периода перед уборкой урожая.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не использовать самолеты.
- Не обрабатывать, если в ближайшие 6 часов ожидается дождь.
- Не наносить на сорняки, находящиеся в состоянии стресса из-за очень сухих, очень влажных, морозных или болезненных состояний. И контроль будет уменьшен и / или медленнее в холодных условиях.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

- Не применять в горячих и сухих климатических условиях (температура выше 33 °С при относительной влажности ниже 50%).
- Избегать контакта с другими культурами.
- **ГЛЮСАР-20%** может использоваться вокруг деревьев менее двух лет, если они эффективно защищены от спрея. Рекомендуемую норму расхода определяют следующими критериями: виды сорняков, стадия роста сорняков, плотность сорняков, климатические условия.
- Необходимо обеспечивать полное покрытие сорняков.
- Не собирать урожай раньше 8 недель после лечения.
- Перед применением важно провести калибровку распылителя.
- Последующее лечение будет необходимо для контроля повторного роста многолетних сорняков.
- Применить, когда сорняки находятся в активной стадии.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти или кормить животных на обработанной зоне в течение 60 дней.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством других гербицидов, но перед использованием рекомендуется проводить тест на совместимость.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**