

# GROUND – UP

## ГРОУНД-АП

### ГЕРБИЦИД

Класс:  
Производные  
глицина

#### РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

**Системный неселективный гербицид, предназначен для борьбы с большим разнообразием однолетних, двулетних и многолетних трав, осоки, широколистных сорняков и древесных кустарников.**

**КОМПОЗИЦИЯ:** Каждый литр содержит:

**ГЛИФОСАТ ИЗОПРОПИЛАММОНИЯ**

**48% вес / объем  
(активного вещества)**

**(Эквивалентен глифосатной кислоте**

**36% вес / объем)**

**БИО-Активатор**

**17%**

#### **СВОЙСТВА:**

**ГРОУНД-АП:** Специальная композиция содержит биоактиватор, который повышает его эффективность и снижает расход раствора до половины.

**ГРОУНД-АП:** Неселективный системный гербицид для борьбы с большим разнообразием однолетних, двулетних и многолетних трав, широколистных сорняков и древесных кустарников.

**ГРОУНД-АП:** Полностью уничтожает сорняки, потому что поглощается непосредственно корнями.

**ГРОУНД-АП:** Безопасен для окружающей среды, потому что быстро разлагается под воздействием бактерий.

**ГРОУНД-АП:** Его действие и эффективность не зависят от низкой или высокой температуры.

**ГРОУНД-АП:** Не имеет предпосевного эффекта, поэтому растения следует высаживать после обработки почвы.

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:**

<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>	<b>НОРМА РАСХОДА / ДОНУМ</b>	<b>ИНТЕРВАЛ</b>
<b>Уничтожение предыдущего урожая и предварительная подготовка</b>	250 - 350 мл/ 20 - 40 л воды	Провести опрыскивание, пока травы и сорняки высотой 30-60 см и до периода цветения.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

<b>последующей культуры</b>		
<b>Деревья: для контроля многолетних трав и широколистных сорняков среди Фруктовых деревьев.</b>	400 - 600 мл/ 10 - 50 л воды	Опрыскивать до периода цветения.
<b>Несельскохозяйственные земли: для контроля однолетних и многолетних трав.</b>	300 - 500 мл/ 10 - 50 л воды	---

Донум = 1000 м<sup>2</sup>

### **ВОДНЫЕ СОРНЯКИ:**

Опрыскивание проводить, когда сорняки достигают в высоте 30 см, пи до периода цветения при норме расхода 250-600 мл / 10-30 л. воды.

### **ДРЕВЕСНЫЙ КУСТАРНИК:**

Опрыскивание проводить, когда сорняки достигают в высоте 30 см, и до цветения при норме расхода 75 - 700 мл Донум; при обработке следует обратить внимание на рост растений, плотность и погодные условия.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Использовать только на вышеупомянутых культурах.
- Не использовать гальванизированные опрыскиватели.

### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Опрыскивание следует проводить с помощью пластиковых или стекловолоконистых распылителей; после применения следует очистить использованный опрыскиватель.
- Норма расхода распыляемого раствора 20-60 л / Донум. Заполнить половину распылителя водой, затем добавить **ГРОУНД-АП** и хорошо перемешать. Затем долить оставшееся количество воды.
- Опрыскивание с помощью обычного распылителя проводить только на травах и сорняках, подлежащих лечению.
- Чтобы повысить эффективность продукта, его следует распылять при вегетативном росте сорняков и до стадии цветения.
- Необходимо орошать обрабатываемую поверхность перед распылением для увеличения эффективности продукта и избегать орошения или культивирования области опрыскивания в течение одной недели после нанесения.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

### **ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:**

- Перед применением препарата необходимо проводить калибровку распылителя.
- Рекомендуется полное покрытие во время распыления, эффективность увеличивается при теплой температуре и нормальной влажности.
- Повторять опрыскивание, если выпадает до 6 часов после окончания.
- Если обрабатываемая площадь была обработана до распыления, то придется подождать, пока сорняки достигнут 20-30 см.
- Сорняки, которые растут в водных каналах, должны обрабатываться, если каналы не содержат воды.
- Чтобы контролировать однолетние сорняки, предпочтительнее начинать распыление, когда они имеют подходящий вегетативный и повторное опрыскивание через 30-45 дней, когда эти сорняки имеют глубокий корневой рост.

### **ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:**

Нельзя пасти или кормить животных в обработанной зоне в течение 21 дня.

### **ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:**

4 часа после последнего применения.

### **СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Не рекомендуется смешивать с другими пестицидами.

### **\* ДРУГАЯ ФОРМУЛА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:**

**GROUND-UP 41% SL W/W, GLYTEX- 48% SL, GLAND UP-48% SL, STIMOZADE-36% SL, FORASATE- 48% SL, WOUND-OUT 48% SL.**

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**