

НАWK-25%

ХОК-25%

Класс:
Гидроксibenзонитрилы

ГЕРБИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Селективный и высокоэффективный послевсходовый контактный гербицид, который действует только через листовую поверхность; применяют для борьбы с широким спектром однолетних широколистных сорняков, произрастающих в луке, чесноке, пшенице и ячмене.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ИОКСИНИЛ ОКТАНОАТ

**25% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ХОК-25%: это контактный гербицид, который проникает через листья и перемещается к корню и ингибирует фотосинтез.

ХОК-25%: контроль широкого спектра сорняков в луке, чесноке и полевых культурах.

ХОК-25%: селективный гербицид с некоторой системной активностью для борьбы с однолетними широколиственными сорняками.

ХОК-25%: не токсичен для пчел.

ХОК-25%: используется для борьбы с однолетними широколиственными сорняками, такими как: амарант, первоцвет, пастушья сумка, гусиная лапка, лебеда, дымянка аптечная, гелиотроп, большая яснотка, люцерна, мак-самосейка, колючий щавель, горец птичий, чертополох, песчанка, крапива.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Луk, чеснок и лук-порей.	200-280 мл/Донум	На стадии 3 листа.
Пшеница ячмень.	160-200 мл/Донум	Обрабатывать начинать от 3 листьев до удлинения стебля предпочтительнее на этапе кущения.

Донум = 1000 м²

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

ВНИМАНИЕ: Использовать только на вышеупомянутых культурах.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед нанесением распылителя важно провести калибровку распылителя.
- При сильном заражении сорняками при опрыскивании использовать высокую дозировку.
- Повторное использование оборудования для распыления может быть при его тщательной очистке водой и раствором с моющим средством.
- Чтобы добиться максимального контроля над сорняками, применять **ХОК-25%** следует к активно растущим сорнякам. Сорняки лучше всего контролировать между этапом появления и стадией отмирания.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить скот с участков, обработанных **ХОК-25%**.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим со многими другими гербицидами, но несовместим с жидкими удобрениями и водорастворимыми 2,4-D составами.

*** ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: НОКС-25% ЕС.**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.