

HERBIFLURIN-48% ГЕРБИФЛУРИН-48%

Класс:
Динитроанилины

ГЕРБИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Селективный предпосевный почвенный гербицид, предназначенный для борьбы с однолетними травами и сорняками, и используют для контроля прорастания семян сорняков.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ТРИФЛУРАЛИН

**48% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ГЕРБИФЛУРИН-48%: селективный предпосевной почвенный гербицид.

ГЕРБИФЛУРИН-48%: высокоэффективен при борьбе с однолетними узколистными и широколистными сорняками.

ГЕРБИФЛУРИН-48%: обладает низкой токсичностью для млекопитающих.

ГЕРБИФЛУРИН-48%: не обладает остаточной активностью на листьях, плодах или семенах, а также при повторном посе урожая.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Необходимо применять и включить гербицид до посадки и появления всходов; хорошо перемешать с почвой. Обработанная почва должна быть влажной или политой после применения препарата.

КУЛЬТУРА	СПОСОБ ОБРАБОТКИ	НОРМА РАСХОДА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Предпосевной гербицид для следующих культур: Посадка рассады: Перец, помидоры, табак, цветная капуста, капуста, брокколи. Посадка семян: Соя, бамя, морковь, репа.	Применение перед посадкой путем смешивания распыляемого раствора с почвой норма расхода 20-40 л / Донума на глубину 8-15 см.	Применять из расчета 120-250 мл / донум / 20 - 40 л воды.	Должен быть применен по крайней мере за 6 недель до посадки или пересадки, также модно применять через 90 дней после посадки, но необходимо

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Сахарная свекла (рассада) (опрыскивание между рядами после появления 4-6 листьев).			избегать контакта с культурой.
---	--	--	--------------------------------------

Донум = 1000 м²

ВНИМАНИЕ:

- Использовать только на выше упомянутых культурах.
- Не высаживать после опрыскивания (до 6-12 месяцев) следующие зерновые культуры: дыня, арбуз, огурец, шпинат, кукуруза, помидоры (семена), перец (семена), цветная капуста (семена), капуста (семена) и сахарная свекла (семена).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: Не пасти или кормить животное в обработанной области в течение 7 дней.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Желательно не смешивать с другими пестицидами.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.