

HERBICIL-20% ГЕРБИКИЛ-20%

Класс:
Бипиридилиевые соли

ГЕРБИЦИД РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Неселективный контактный гербицид, контролирует развитие широкого спектра широколистных сорняков и трав (цитрусовые, яблоневые, сливовые, абрикосовые, персиковые и банановые сады), междурядный контроль сорняков среди овощных культурах, поля сахарного тростника, стерневая очистка, обновление пастбищ.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ПАРАКВАТ

20% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ГЕРБИКИЛ-20%: Неселективный контактный гербицид контролирует большое разнообразие сорняков.

ГЕРБИКИЛ-20%: гербицид действует после появления всходов без остаточной активности, быстро инактивируется при контакте с почвой.

ГЕРБИКИЛ-20%: не оказывает негативного влияния на почву, так как быстро разлагается.

ГЕРБИКИЛ-20%: используется как осушитель сельскохозяйственных культур и в качестве дефолианта на картофеле.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Смешать **ГЕРБИКИЛ-20%** с чистой водой в баке для опрыскивания:

| КУЛЬТУРА | СОРНЯК | НОРМА РАСХОДА мл / Донум | КОЭФФИЦИЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ ГЕРБИКИЛ-20% : вода |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Цитрусовые, Яблоки, Слива, Абрикос и Персик | Однолетние и многолетние | 150 – 500 мл | 1 мл : 400 мл |
| | травы и широколист ные | 150 – 300 мл | 1 мл : 500 мл |
| Междурядная борьба с | | 230 – 470 мл | 1 мл: 400 мл |

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

| | | | |
|--|----------|-------------|---------------|
| сорняками среди овощных культур | сорняки. | | |
| Сахарный тростник | | 200 мл | 1 мл : 120 мл |
| Очистка от стерни | | 60 – 350 мл | 1 мл : 150 мл |
| Обновление пастбищ | | 60 – 450 мл | 1 мл : 400 мл |

Донум = 1000 м²

ВНИМАНИЕ: Использовать только на выше упомянутых культурах.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед нанесением распылителя важно провести калибровку распылителя.
- Опрыскивать молодые сорняки (высотой 15 см или меньше), необходимо добиться полного покрытия гербицидом расиений.
- **ГЕРБИКИЛ-20%** убивает все зеленые ткани растений, поэтому необходимо избегать контакта с другими культурами, произрастающими рядом с полем.
- Использовать низкую дозировку для опрыскивания густых или рыхлых сорняков.
- Использовать высокую дозировку для опрыскивания при сильном заражении сорняками.
- Для борьбы с сорняками между рядами на овощных полях, применять осторожно, когда высота сорняков составляет 10 см или менее (рекомендуется использовать защитный чехол на овощи во время опрыскивания).
- Для борьбы с сорняками на полях люцерны, применять в течение 2-3 дней после сбора урожая, если возраст растений составляет около 6 месяцев и в стадии покоя.
- Можно использовать при предпосевной обработке урожая, за исключением песчаной почвы (применяют за 3 дня до посадки).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных на обработанном участке в течение 48 часов с момента последнего применения.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов после последнего применения.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.