

HERBSTAR-25%

ГЕРБСТАР-25%

Класс:
Оксадиазолы

ГЕРБИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Селективный довсходовый гербицид, предназначенный для борьбы со многими однолетними травами и широколистными сорняками.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ОКСАДИАЗОН

25% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ГЕРБСТАР-25%: селективный довсходовый гербицид для борьбы со многими однолетними травами и широколистными сорняками.

ГЕРБСТАР-25%: поглощается главным образом через листья и быстро перемещается, останавливая рост в течение нескольких часов после обработки.

ГЕРБСТАР-25%: одно применение обеспечивает борьбу с сорняками в течение всего сезона.

ГЕРБСТАР-25%: в почве разлагается медленно; наиболее эффективен при использовании на влажной почве.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Селективный довсходовый контактный гербицид, главным образом поглощаемый листвой, быстро перемещается к растущим кончикам корней и останавливает рост сорняка в течение нескольких часов после обработки.

КУЛЬТУРА	СОРНЯК	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	НОРМА РАСХОДА
Лук	Широколистные сорняки, такие как маргаритка, омела, крапива, дикая	Опрыскивать рано, когда растения достигают высоты 15 см (после стадии 3 листьев) или через 20-30 дней после пересадки, или обрабатывать сразу после посева.	200-300 мл / Донум зависит от плотности сорняков.
Чеснок	горчица, аралия голос тебельная,	Распылять после посадки луковиц и до того момента, как сорняки прорастут;	

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	подмаренник и однолетние травы, такие как:	желательно провести орошение, чтобы повысить активность гербицида.	
Бобы, виноград, абрикос, персик, слива, вишня, нектарин, яблоко, груша и декоративные растения	пастушья сумка, молочай, дикий овес, лисохвост щетинистый	Довсходовая обработка	

Донум = 1000 м²

ВНИМАНИЕ: Использовать только на выше упомянутых культурах с соблюдением периода повторной обработки и ограничения на выпас скота.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед обработкой провести калибровку опрыскивателя.
- Избегать рыхления почвы сразу после обработки.
- Необходимо увлажнить почву во время опрыскивания.
- **ГЕРБСТАР-25%** не контролирует сорняки, которые размножаются луковицами или корневищами.
- Результаты контроля появляются через 5-10 дней после опрыскивания.
- Не остается на луке во время сбора урожая.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных на обработанном участке.

*** ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ROOTAGE-25% ЕС.**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.