

KRATOS-24%

КРАТОС-24%

Класс:
Тетрановая
кислота

АКАРИЦИД КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

Новый несистемный контактный акарицид, который демонстрирует хорошую и отличную эффективность на всех этапах развития клещей, включая яйца на фруктовых деревьях, цитрусовых и винограде.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

СПИРОДИКЛОФЕН

**24% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

КРАТОС - 24%: несистемный акарицид с контактным воздействием на яйца клещей, личинки и взрослые самки.

КРАТОС - 24%: высоко устойчив к осадкам, обладает длительным эффектом.

КРАТОС - 24%: слегка токсичен, не влияет на млекопитающих и безопасен для окружающей среды и естественных врагов.

КРАТОС - 24%: применяется против клещей, устойчивых к другим акарицидам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА МЛ/ 20 Л ВОДЫ	ПЕРИОД РАСПАДА (ДНИ)
Семечковые: Яблоко, груша	Европейский красный клещ, клещ Шлехтендаля, галловый клещ у груши, двупятнистый паутинный клещ, паутинный клещ Макданиэля	4-8	14
Косточковые: Слива, Персик, Нектарин, абрикос, вишня, миндаль	Европейский красный клещ, клещ Шлехтендаля, галловый клещ у груши, двупятнистый паутинный клещ, паутинный клещ Макданиэля	8-12 4-6	14
Виноград	Европейский красный клещ, двупятнистый паутинный клещ, паутинный клещ Макданиэля	4-8	14
Цитрусовые	Цитрусовый галловый клещ, двупятнистый паутинный клещ, цитрусовый красный клещ	2-6	14
Орех, кешью, каштаны	Европейский красный клещ, двупятнистый паутинный	0.75 л/Га	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

	клещ, паутинный клещ Макданиэла		
Черника	Черничный клещ	1.3 л/Га	7
Авокадо, Папайя, Манго	коричневый клещ Авокадо, красный клещ Авокадо, черный и красный паутинный клещ Манго, листовой клещик Папайя, двупятнистый паутинный клещ.	13 - 15	2
Фундук	Клещ американского лесного ореха	12 - 13	7

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный срок безопасности перед уборкой урожая.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

48 часов после последнего лечения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов. Предпочтительно использовать раствор для распыления сразу после смешивания, перед опрыскиванием рекомендуется провести тест на совместимость.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.