MANCOTHANE-80%

МАНКОТАН-80%

Класс:
Дитиокарбаматы

ФУНГИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Фунгицид используется для защиты многих сельскохозяйственных культур (картофель, помидоры, лук, чеснок, баклажаны, перец, тыквенные, фасоль, горох, семечковые, цитрусовый, табак, цветы и другие культуры) от заражения грибковыми заболеваниями: ранняя гниль, фитофтороз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, антракноз, пятнистость, гниль, ржавчина, парша и голубая плесень.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

МАНКОЗЕБ 80% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

МАНКОТАН-80%: один из самых успешных фунгицидов для борьбы с широким спектром грибковых заболеваний: ранняя гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, пятнистость, антракноз, гниль, ржавчина, парша и синяя плесень.

МАНКОТАН-80%: Увеличивает рост и увеличивает урожайность, поскольку содержит цинк и марганец.

МАНКОТАН-80%: не фитотоксичен, если при использовании следовать указанным рекомендациям по применению.

МАНКОТАН-80%: Стабильный пестицид, не подвержен воздействию дождя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

А. ВНЕКОРНЕВОЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Картофель	Ранняя гниль, мучнистая роса	50	Когда растения достигают 7-12 см высотой, или при появлении болезни.	5
Помидоры	Ранняя гниль, мучнистая роса, пятнистость листьев, антракноз	50	Начать применение при появлении болезни и повторять каждые 7-10 дней.	5
Лук и	Ложная	50	Когда растение содержит	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.

чеснок	мучнистая роса, мучнистая роса, плесень		4-6 листьев и повторять каждые 7-10 дней.	
Баклажын и перец	Гниль, Антракноз	50	Применять, когда растения достигают 12-20 см в высоту или когда начинают плодоносить и повторять каждые 7-10 дней.	5
Тыква	Ложная мучнистая роса, пятнистость, антракноз	50	Когда растения начинают расти и удлиняться, повторять каждые 7-10 дней.	5

Горох, фасоль	Ложная мучнистая роса, ржавчина, антракноз	50	Начать применение при появлении болезни и повторять каждые 7-10 дней.	5
Семечковы е фрукты	Черная пятнистость, листовая пятнистость	50	Когда почки начинают цвести и повторять каждые 7-10 дней в период цветения до начала зимы.	21
Цитрусовы е деревья	Парша, пятнистость.	24 – 30	В середине мая (от парши). При появлении инфекции (от пятнистости).	21
Тобак	Голубая плесень.	20 – 30 В теплице 40 г в грунт	В теплице, когда у растения появляется 2 истинных листьях. И повторять каждые 5-6 дней.	7
Виноград	Черная гниль, Ложная мучнистая роса, Экскориоз	56	- Применять 10-14- дневные интервалы до тех пор, пока фрукты не затветдеют или за 66 дней до сбора урожая. - Не применять после затвердения фруктов.	66
Сахарная свекла	Церкоспороз	28 – 56	- Повторять каждые 7-10 дней по мере необходимости. - Не применять в течение 14 дней после сбора	21

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.

			урожая. - Не скармливать обработанные верхушки скоту.	
Цветы (розы, гвоздик, георгин, гладиолус)	Плесень, ржавчина, гниль, пятна.	50	Наносить на листья растений еженедельно в течение сезона роста. В фазе цветения обрабатывать два раза в неделю, чтобы защитить растение от пятнистости и плесени.	7
Арахис		400 г / 100 кг		

ВНИМАНИЕ: Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период до сбора урожая.

А. ОБРАБОТКА СЕМЯН:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г /100 кг СЕМЯН
ХЛОПОК	Черная ножка, гниль рассады	150 - 300
РИС	Черная ножка, гниль рассады и корней	200
АРАХИС	Черная ножка, гниль рассады и корней	400

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обработанные семена не пригодны для употребления в пищу человеком.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством пестицидов, но несовместимыми с соединениями, содержащими кальций.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.