

МАНТОХ МАНТОКС

**ФУНГИЦИД
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК**

Класс:
Дитиокарбаматы ⁽¹⁾
Неорганические
соединения ⁽²⁾

Защитный фунгицид, высокоэффективный в борьбе со многими грибковыми заболеваниями.

СОСТАВ: Каждый килограмм содержит:

МАНКОЦЕБ ⁽¹⁾ 20% вес / вес (активного вещества)

**ЧИСТАЯ МЕДЬ ⁽²⁾
(В ВИДЕ ОКСИХЛОРИДА МЕДИ) 21,5% вес / вес
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

МАНТОКС: Защитный фунгицид, высокоэффективный в борьбе со многими грибковыми заболеваниями на широком спектре сельскохозяйственных культур.

МАНТОКС: обладает широким спектром действия для борьбы с грибковыми заболеваниями и стойкой формой по отношению к другим пестицидам.

МАНТОКС: имеет более длительный период защиты, чем любые другие фунгициды, содержит Манкоцеб в качестве активного ингредиента, который необходим для роста урожая.

МАНТОКС: содержит цинк и марганец, необходимые для роста урожая.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ г / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Огурцы, помидоры, лук, фасоль, капуста, картофель, бамия, баклажаны, перец.	Гниль, антракноз, церкоспороз листьев, ложная мучнистая роса, ржавчина, угловая пятнистость листьев.	30 - 45	7
Банан, лимон, апельсин, помело, мандарин, гуава, манго, миндаль, персик, абрикос, вишня, нектарин.	Листовые пятна, плодовые пятна, антракноз, курчавость листьев персика.	30 - 45	21

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Повторять опрыскивание каждые 10-14 дней или с меньшими интервалами при задержке роста растений.
- Приготовленный раствор для распыления необходимо сразу использовать, продолжая его перемешивать.
- Опрыскивать косточковые деревья после обрезки и перед распусканием бутонов; для контроля скручивания листьев у сливы использовать **МАНТОКС** 100 - 150 г / 20 л воды.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ:

Нефитотоксичен при рекомендованных дозах, за исключением моркови и картофеля при определенных условиях. Может происходить рассечение у некоторых сортов яблок.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме Тирама, серной извести и Дитиокарбаматов.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.