

NOGREEN-28%

НОГРИН-28%

ГЕРБИЦИД

Класс:
Гидроксibenзонитрилы

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Селективный контактный гербицид избирательного действия, предназначен для борьбы с однолетними широколиственными сорняками после появления всходов пшеницы, ячменя, кукурузы, лука, чеснока, люцерны, на полях свободных от сельскохозяйственных культур и в промышленных зонах.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

БРОМОКСИНИЛ ОКТАНОАТ

**28% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

НОГРИН-28%: селективный контактный гербицид с незначительной системной активностью; поглощается листвой, обладает ограниченной транслокацией.

НОГРИН-28%: контролирует развитие сорняков, подавляет фотосинтез.

НОГРИН-28%: селективный контактный гербицид, используемый для борьбы с однолетними широколиственными сорняками после появления всходов пшеницы, ячменя, кукурузы и лука.

НОГРИН-28%: умеренно токсичен для млекопитающих, токсичен для рыб и не токсичен для пчел.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	СОРНЯКИ	ДОЗИРОВКИ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Пшеница, ячмень	Однолетние широколиственные сорняки, такие как: хризантема, подмаренник, колючий щавель.	1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / Га) После появления всходов до начала стадии кущения.	42 дня
Кукуруза		1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / Га). Наносить на стадии 2-8 листов.	42 дня
Чеснок		2,3 - 3 л / Га (200 - 400 л воды / Га). Наносить после появления всходов, но до высоты 30 см.	3.5 месяца
Лук		1,5-2 л / Га (200-400 л воды / Га). Наносить на стадии 2 - 5	1 месяц

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

		ЛИСТОВ.	
Люцерна		1,5-2 л / Га (200 - 400 л воды / Га). Применять от сорняков, когда достигают высоты 5 см.	1 месяц
Необрабатываемые земли и промышленные площадки		1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / Га). Наносить при появлении сорняков и их активном росте.	---

Донум = 1000 м² Гектар = 10000 м²

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культурах, соблюдая рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Важно провести калибровку опрыскивателя перед применением.
- Опрыскивать следует до 6-й стадии листьев.
- Необходимо обеспечить полное покрытие всех сорняков гербицидом.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных не менее 60 дней с момента последнего применения.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством других гербицидов.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**