

РАТРОН-25%

ПАТРОН-25%

Класс:
Бензоилмочевины

ИНСЕКТИЦИД

РЕГУЛЯТОР РОСТА НАСЕКОМЫХ (IGR) СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Ингибитор синтеза хитина, который препятствует образованию кутикулы насекомого.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ДИФЛУБЕНЗУРОН

**25% вес / вес
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ПАТРОН-25%: ингибитор синтеза хитина, который препятствует образованию кутикулы насекомого и приводит к нарушению процесса линьки.

ПАТРОН-25%: несистемный регулятор роста насекомых с контактным и желудочным действием; эффективность пестицида проявляется во время линьки или при вылуплении яиц.

ПАТРОН-25%: безопасен для окружающей среды благодаря своей селективности и быстрому разложению в почве и воде. Не влияет на пчел или естественных врагов.

ПАТРОН-25%: более активен против молодых личинок и оказывает контактное воздействие на яйца, не влияя на стадию взросления.

ПАТРОН-25%: слегка токсичен для млекопитающих.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА г/20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
ЯБЛОНИ	ПЛОДОЖОРКА, ТОЧИЛЬЩИК	8	2 НЕДЕЛИ
ГРУШИ	ГРУШЕВАЯ ЛИСТОБЛОШКА	8 г +60 мл ЛЕТНЕГО МАСЛА	
МАЛИНА	ПЛОДОВАЯ МОЛЬ	8	
КОСТОЧКОВЫЕ ФРУКТЫ	СЛИВОВАЯ ПЛОДОВАЯ МОЛЬ, ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОВАЯ МОЛЬ,	8 8	

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	ОЛИВКОВАЯ МОЛЬ	4 - 8	
ОРЕХИ: КАШТАНЫ ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ ЛЕСНЫЕ ОРЕХИ ФИСТАШКИ	ПЛОДОЖОРКА, КАШТАНОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА, МОЛЬ СОСНОВОГО ШЕЛКОПРЯДА, ФИСТАШКОВАЯ ПОЧКОПОБЕГОВАЯ ГУСЕНИЦА	4 - 6	
ЦИТРУСОВЫЕ	ЦИТРУСОВЫЙ ГАЛЛОВЫЙ КЛЕЩ, ЦИТРУСОВЫЙ ДОЛГОНОСИК	3 - 5 6 - 12	
КАПУСТА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, РЕДИС АРТИШОКИ	КАПУСТНАЯ БАБОЧКА, ХЛОПКОВЫЙ ЛИСТОВОЙ ЧЕРВЬ, КАПУСТНАЯ МОЛЬ, СОВКА КАПУСТНАЯ, АРТИШОКОВАЯ ПАЛЬЦЕКРЫЛКА	8 - 12 12 - 20 16 - 20 6 - 20 5.6 - 11.2	
КЛЕВЕР И ЛЮЦЕРНА	ХЛОПКОВЫЙ ЛИСТОВОЙ ЧЕРВЬ, ЛЮЦЕРНОВЫЙ И БЕЛЫЙ БАХРОМЫЙ ДОЛГОНОСИК	6 - 12 4 - 8	2 НЕДЕЛИ
КУКУРУЗА И СОРГО	СОВКА	5.6 - 8	
ПОДСОЛНУХ	ГУСЕНИЦЫ	8	
СОЯ	БОБОВАЯ СОВКА СОЕВЫЙ ЖУК ЗЕЛЕНАЯ ГУСЕНИЦА ОГНЕВКИ СЕННОЙ СОЕВАЯ ПЯДЕНИЦА	1.6 - 2.8 2.8 - 6.0 2.8 - 6.0 5.6 - 8	
ЧАЙ	ЧАЙНАЯ ЛИСТОВЕРТКА	2.5 - 5	
ГРИБЫ	МУХИ	4 г на м ² в 2.5 л воды	
ХЛОПОК	ХЛОПКОВЫЙ ДОЛГОНОСИК, СОВКА, ХЛОПКОВЫЙ ЛИСТОВОЙ ЧЕРВЬ, ХЛОПКОВЫЙ СВЕРЛИЛЬЩИК	5.6 12 - 24 6 - 12 6 - 10	
МАСЛИЧНАЯ ПАЛЬМА	КРАПИВНАЯ ГУСЕНИЦА, МЕШОЧНИЦА, ЛИСТОВЫЙ ЧЕРВИ	4 - 5.6 4 - 5.6 10 - 12	
АРАХИС	СВЕКОЛЬНАЯ СОВКА, ОСЕННЯЯ СОВКА, АРАХИСОВЫЙ ЛИСТОВОЙ ТКАЧ, ТАБАЧНАЯ ГУСЕНИЦА,	12 - 24 6 - 8 6 6 - 12	

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	КРАСНАЯ ВОЛОСАТАЯ ГУСЕНИЦА	2 - 4	
РИС	РИСОВЫЙ ДОЛГОНОСИК, ОСЕННЯЯ СОВКА, РИСОВАЯ ПЯДЕНИЦА, РИСОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА, СОВКА	6 - 12 5.6 - 8 6 - 12 6 -20 6 - 20	
ЛЕСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	БЕЛОКРЫЛКА, ТЛЯ	3 - 4	1 НЕДЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЯ:

- **ПАТРОН-25%** следует применять на ранней стадии жизни насекомых (до или во время периода овуляции), а также на ранней стадии развития личинок.
- Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендуемый безопасный период до урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

12 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

- Совместим с большинством распространенных пестицидов.
- Перед применением необходимо сделать пробный тест на смешивание с эмульгируемым концентратом.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.