

PENDILIN- 40%

ПЕНДИЛИН-40%

Класс:
Динитроанилины

ГЕРБИЦИД КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

Селективный почвенный гербицид, используется для борьбы с однолетними травами и широколиственными сорняками в широком спектре сельскохозяйственных культур.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ПЕНДИМЕТАЛИН

**40% вес / объем
(активного веществ)**

СВОЙСТВА:

ПЕНДИЛИН - 40%: селективный гербицид, поглощаемый листьями и корнями.

ПЕНДИЛИН - 40%: используется против большинства однолетних трав и широколиственных сорняков.

ПЕНДИЛИН - 40%: применяется до появления всходов, до пересадки или сразу после появления всходов для широкого спектра культур, которые указаны в таблице.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

КУЛЬТУРА	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА (л/Га)	КОММЕНТАРИИ
Озимый ячмень, Озимая пшеница	Предвсходовая обработка урожая до появления колосьев	3.3	Не обрабатывать посевы после 30 ноября.
Ячмень яровой	До появления всходов	3.3	-Применять после посева и до появления всходов. - Использовать ПЕНДИЛИН - 40% после посева культуры, если в ближайшее время ожидается дождь.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**

Лук, лук-порей	Предпосевная обработка и перед пересадкой.	3.3	- Применять после сеялки, но до появления урожая и сорняков. - Пересаживание посевов (применяют до пересадки) - Не обрабатывать лук или лук-порей, если ожидается сильный дождь.
Морковь, пастернак	До появления всходов	3.3	- Применять после сеялки, но до появления всходов и сорняков.
Брокколи, капуста, цветная капуста	Перед пересадкой	3.3	- Применять после окончательного выращивания рассады, но до пересадки - Не применять ПЕНДИЛИН - 40% после посадки, так как может произойти повреждение урожая. - Не использовать ПЕНДИЛИН - 40% на пересаженной капусте, если ожидается сильный дождь.
Картофель	До появления урожая	3.3	- Обрабатывать урожай следует сразу после посадки и до окончательной уборки. - Применять за 7 дней до появления всходов.
Клубника	После образования соцветий и до момента их распускания	3.3	- ПЕНДИЛИН - 40% следует наносить на посаженные побеги в состоянии покоя осенью или ранней весной сразу после посадки и до появления сорняков. - Не рекомендуется предпосевное применение ПЕНДИЛИН - 40% .
Яблоко, вишня, груша, слива	До распускания почек	3.3	- ПЕНДИЛИН - 40% обрабатывают почву без сорняков с осени до ранней весны. - ПЕНДИЛИН - 40% не рекомендуется использовать после окончания марта, если почва не достаточно влажная.

Гектар = 10000 м².

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Используется только на вышеупомянутых культурах.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не применять **ПЕНДИЛИН - 40%** для культур, находящихся в состоянии стресса.
- Семена должны быть покрыты на 3,2 см осевшей почвой (минимум).
- Не беспокоить почву после применения **ПЕНДИЛИН - 40%**, так как это приведет к снижению контроля над сорняками.
- Не опрыскивайте нижние посевы.
- **ПЕНДИЛИН - 40%** не следует использовать на защищенных культурах или в теплицах.
- Не используйте на почвах с содержанием органических веществ более 10%.
- Для усиления действия **ПЕНДИЛИН - 40%** почва должна быть влажной. Наилучшие результаты будут получены, если в течение семи дней после нанесения гербицида выпадет дождь.
- Норма расхода должна быть равна 100-200 литров воды на гектар.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Не вводите поле до 24 часов с момента последнего применения.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животные на обработанном участке в течение 24 часов с момента последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Несовместим с большинством распространенных пестицидов и удобрений.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.