

PROXNIL-62.5% WDG ПРОКСНИЛ-62.5%

Класс:
Анилинопиримидины
Фенилпирролы

ФУНГИЦИД ВОДОДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ

Системный защитный фунгицид, эффективный против широкого спектра грибковых заболеваний сельскохозяйственных культур, упомянутых в таблице применения.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ЦИПРОДОНИЛ
ФЛУДИОКСОНИЛ

37,5% вес / вес (активного вещества)
25,0% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ПРОКСНИЛ-62,5%: новый фунгицид, используемый для контроля широкого спектра грибковых заболеваний и защиты от устойчивых в отношении других фунгицидов сортов.

ПРОКСНИЛ-62,5%: комбинация двух фунгицидов (Ципродонил и Флудиоксонил) для борьбы с серой плесенью на винограде, репчатом луке, серая плесень, антракноз и ризопус на клубнике, серая плесень и антракноз на чернике.

ПРОКСНИЛ-62,5%: высокоэффективный фунгицид, обладающий длительной остаточной активностью на растениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	ГАРМА РАСХОДА (г/20 л)	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Фасоль	Белая плесень, серая плесень	15 - 20	7
Картофель	Бурая гниль, ранняя порча, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	15 - 20	14
Брокколи, капуста, цветная капуста, капуста, горчица	Мучнистая роса	10 - 17	7
	Альтернариоз, церкоспороз листьев	15 - 20	

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.

Огурцы, арбузы, дыни, тыквы, кабачок	Альтернариоз листьев, септориоз, клейкая стволовая гниль, мучнистая роса.	15 - 20	7
Сельдерей, салат, петрушка, шпинат	Альтернариоз листьев, септориоз, серая плесень, склеротиниоз, базальная гниль, мучнистая роса	15 - 20	7
Свекла, морковь, редька, репа, сладкий картофель	Мучнистая роса, альтернариоз	15 - 20	7
Лук, чеснок	Серая плесень, пурпурная пятнистость, гниль основания, черная плесень.	15 - 20	7
	Заболевание почвы: Белая гниль	10 - 20 (применять во время посадки в виде спрея для борозд)	
Помидоры, баклажаны, перец, бамя	Ранняя порча, серая плесень, мучнистая роса, пятнистость	15 - 20	7
Авокадо, гуава, манго	Серая плесень фруктов, альтернариоз листьев, антракноз	15 - 20	21
Цитрусовые	Альтернариоз стебля и корней, антракноз, голубая плесень, зеленая плесень	15 - 20	21
Виноград	Серая плесень, кислая гниль (вызванная комплексом грибов)	15 - 20	14
Клубника	Серая плесень, мучнистая роса, антракноз	15 - 20	14

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА	ПРИМЕНЕНИЕ
Гранат	Серая фруктовая плесень, серая плесень	29 г/ 1 л	Окунуть в течение 30 секунд и дать фруктам высохнуть.

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим со многими широко используемыми фунгицидами и инсектицидами, перед смешиванием провести тест на совместимость.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

24 часа с момента последнего распыления.

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.