

PROPORID 72.2%

ПРОПОРИД 72.2%

Класс:
Карbamаты

ФУНГИЦИД РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Системный фунгицид с профилактическим и лечебным действием, используемый для борьбы с почвенными грибами и грибковыми заболеваниями на культурах, упомянутых в таблице использования.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

ПРОПАМОКАРБ ГИДРОХЛОРИД

**72,2% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ПРОПОРИД-72,2%: Системный фунгицид с профилактическим и лечебным защитным действием, используемый для борьбы с почвенными грибами и грибковыми заболеваниями на сельхозкультурах.

ПРОПОРИД-72,2%: имеет длительную остаточную активность в течение 3 - 8 недель; действие препарата зависит от температуры, освещенности и типов почвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Помидоры, капуста, редька и картофель	Корневая гниль (Питиум и Фитофтора) Ложная мучнистая роса	Посев семян: Сразу после посадки добавить 70 мл / 20 л воды и обработать поверхность почвы со скоростью 2-4 л (раствор) / м ² . Теплица: • Перед пересадкой: добавить 70 мл / 20 л воды на поверхность почвы со скоростью 2-4 л (раствор) / м ² . • После пересадки: добавить 20 мл / 20 л воды на	7 дней, за исключением капусты 14 дней

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

	Ранняя гниль (Фитофтора)	поверхность почвы со скоростью 200 мл (раствор) / растение, повторяя каждые две недели по мере необходимости. Лиственный спрей: 30 мл / 20 л воды	
--	------------------------------------	---	--

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Огурец	Корневая гниль (Питиум и Фитофтора) Ложная мучнистая роса	Посев семян: Непосредственно после посадки добавить 70 мл / 20 л воды к поверхности почвы со скоростью 2-4 л (раствор) / м². Теплица: • перед пересадкой: Добавить 70 мл / 20 л воды на поверхность почвы со скоростью 2-4 л (раствор) / м². • После пересадки: Добавить 20 мл / 20 л воды на поверхность почвы со скоростью 200 мл (раствор) / растение, повторяя каждые две недели по мере необходимости. Лиственный спрей: 50 мл / 20 л воды.	3 дня
Декоративное растение	Корневая гниль (Питиум и Фитофтора)	Посев семян и Теплица: Использовать и применять так же, как указано выше. Резка: Добавить 5-15 мл / 10 л воды на поверхность почвы со скоростью 5 - 10 л (раствор) / м².	---

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на выше указанных культурах и следовать рекомендованному безопасному периоду перед сбором урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством распространенных пестицидов, несовместимых с жидкими удобрениями; рекомендуется смешивать **ПРОПОРИД** с водой, а затем добавить другой пестицид перед смешиванием.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.