

SENTHION S-100

СЕНТИОН С-100

Класс:
Органофосфаты

ИНСЕКТИЦИД УЛЬТРАМАЛЫЙ ОБЪЕМ

Высокоэффективный фосфорорганический инсектицид широкого спектра действия, применяют против различных насекомых-вредителей.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ФЕНИТРОТИОН

**100% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

СЕНТИОН С-100: высокоэффективный фосфорорганический инсектицид, действует как контактный и желудочный яд.

СЕНТИОН С-100: умеренно токсичен для млекопитающих.

СЕНТИОН С-100: способен проникать в ткани растений. Не фитотоксичен при использовании в соответствии с рекомендациями, за исключением крестоцветных (капуста, цветная капуста, редька и репа).

СЕНТИОН С-100: нет необходимости смешивать его с водой, а норма расхода зависит от культуры и заражения.

СЕНТИОН С-100: обладает длительным действием и сильной активностью против нимфальных и взрослых насекомых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / Донум	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Полевые культуры	Точильщики, тля, трипсы.	50 – 100	30
Финиковая пальма	Пальмовый Дубас	100 – 150	21
Слива, Персик, Миндаль, Абрикосы, Вишня, Нектарин	Плодожорка, минеры, тля.	100 – 150	21
Хлопок	Тля, хлопковый клоп, джассиды, белокрылки.	50 – 100	---

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	Личинка моли	100 – 200	
Сахарный тростник	Хлопковая тля, тростриковый точильщик	50 – 100	---
	Розовый точильщик	100 – 150	
Чай	Чайный минер, малая чайная продоржорка	50 – 100	---
Рис	Полосатый рисовый точильщик, рисовый точильщик, зеленая рисовая цикадка, травяные цикадки	50 – 100	---
	Шитники, рисовая зеленая гусеница	50	
Лес	Еловый почкоед	50	---
Пастбище	Долгоносмк клубеньковый люцерновый (<i>Sitona Humeralis</i>)	100 – 150	---
	<i>Wiseana Cervinata</i>	50 – 100	
	Бескрылая травяная цикадка (<i>Diclorphus Spp</i>)	50	
Пшеница	Щитники-черепашки	50 – 100	

Донум = 1000 м².

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период до сбора урожая.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не наносить на крестоцветные (капуста, цветная капуста, редька и репа).
- При применении препарата обязательно использовать распылитель.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ:

- Не фитотоксичен при использовании в соответствии с рекомендациями. Хлопок, капуста и некоторые фрукты могут быть повреждены из-за высокой концентрации препарата.
- У некоторых сортов яблонь может возникнуть побурение плодов.
- Не использовать препарат на крестоцветных (капуста, цветная капуста, редька и репа).

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов. При смешивании с щелочным соединением полученную смесь следует использовать сразу после смешивания.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.