

SULFON-75%

СУЛЬФОН-75%

Класс:
Сульфонилмочевина

ГЕРБИЦИД ВОДОДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ

Селективный системный гербицид, предназначен для контроля многих видов трав и широколистных сорняков на пшеничном поле.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

СУЛЬФОСУЛЬФУРОН

75% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

СУЛЬФОН-75%: селективный системный гербицид контролирует многие виды трав и широколистных сорняков на пшеничном поле.

СУЛЬФОН-75%: в урожае могут сохраняться очень низкие остатки гербицида из-за высокого уровня активности.

СУЛЬФОН-75%: вскоре после применения гербицида рост восприимчивых сорняков подавляется и они перестают конкурировать с сельскохозяйственными культурами. Результаты воздействия появляются через 1-3 недели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	СОРНЯКИ	НОРМА РАСХОДА	ВНИМАНИЕ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Озимая пшеница	Травы и широколистные сорняки	47.25 г / Га	- Обработать до и после появления всходов. - Не применять предпосевную обработку на непахотных землях или когда на поверхности почвы в больших количествах присутствуют растительные остатки (растительный материал)	сено: 30 дней. Зерно: 55 дней.
Яровая пшеница			- Обработать только после появления всходов пшеницы и до появления колосьев. - Не рекомендуется применять для твердых сортов пшеницы, так как вызывает ингибирование роста,	

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

			что не влияет на урожайность.	
--	--	--	-------------------------------	--

Гектар = 10000 м²

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед использованием провести калибровку распылительного оборудования.
- Для достижения наилучших результатов обрабатывать следует после появления всходов, когда наблюдается активный рост сорняков (на ранних стадиях развития).
- Обеспечить полное покрытие гербицидом сорняков.
- При применении этого продукта необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить сельскохозяйственные культуры.
- Качество мероприятий, направленных на борьбу с сорняками зависит от нормы внесения, вида и размера сорняков и условий их произрастания.
- Вскоре после применения гербицида рост восприимчивых сорняков блокируется и они перестают конкурировать с культурой. После подавления роста тяжелые заражения следует лечить на ранних стадиях, прежде чем сорняки станут слишком конкурентоспособными по отношению к урожаю.
- Не наносить через какую-либо систему орошения.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных в течение 14 дней с момента последнего применения.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

12 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

- Перед смешиванием сделать тест на совместимость.
- Несовместим с растворами удобрений с рН ≤ 5, а также с неионогенными поверхностно-активными веществами или другими добавками, которые изменяют рН распыляемого раствора ниже рН ≤ 5.
- Несовместим с малатионами и фосфорорганическими соединениями.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**