

SUPER-FER СУПЕР-ФЕР

Класс:
Переходные металлы

РАСТИТЕЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА / РАСТВОРИМЫЕ МИКРОГРАНУЛЫ

Используется для коррекции дефицита железа у сельскохозяйственных и декоративных растений, произрастающих в щелочных и известковых почвах. Является регулятором роста у растений.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА

6% (ЖЕЛЕЗО В ВИДЕ FeEDDHA)

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Следующие показатели указывают на верхний и нижний пределы. Фактическое количество будет зависеть от размера растения или дерева, а также от степени дефицита железа.

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Косточковые и семечковые фрукты: (Яблоко, абрикос, персик, груша, слива).	25 – 125 г / дерево	Когда симптомы дефицита железа начинают появляться, или в середине-конце зимы, до роста растений.
Цитрусовые	100 – 150 г / дерево В рамках ежегодной программы технического обслуживания.	Наносят на почву вокруг растения ниже предела распространения ветвей.
Виноград	750 – 1500 г / 100 м на ряд	
Зерновые культуры, сахарный тростник, хлопок, овощи (Горох, фасоль, картофель, помидор), корнеплоды.	250 – 550 г / Донум	Непосредственно перед посевом или посадкой или когда симптомы дефицита железа начинают появляться, между рядами или через ирригационных систем на уровне земли.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Клубника и малина.	750 – 1500 г / 100 м на ряд	Когда симптомы дефицита железа начинают появляться. Нанесите на почву широким кругом или путем растворения в воде и добавляя к почве, покрывая тонким слоем почву вокруг растения.
Форсайты и другие кустарники	20 – 50 г / растение	
Годовые и многолетние декоративные растения.	60 г / 10 м ²	

Донум = 1000 м²

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- При использовании в ирригационной системе из предыдущего раздела следует выбрать соответствующую норму расхода. Затем его следует применять через систему орошения со скоростью не более 1 кг (сухой вес) на 10000 литров воды.
- Если на деревьях растут сорняки или трава, увеличьте рекомендуемую норму расхода 50%.
- Если почва уплотнена, поверхность должна быть разбита мотыгой или боронованием перед нанесением.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**