

TEFLON-50%

ТЕФЛОН-50%

Класс:
Мочевина

ГЕРБИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Селективный системный гербицид, поглощаемый главным образом корнями и незначительно листвой, с транслокацией преимущественно в ксилеме.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ЛИНУРОН

**50% вес / вес
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ТЕФЛОН-50%: довсходовый и послевсходовый контроль однолетних трав и широколистных сорняков, и некоторые виды многолетних сорняков, применим для широкого спектра культур (картофель, морковь и петрушка).

ТЕФЛОН-50%: имеет низкую токсичность для млекопитающих.

ТЕФЛОН-50%: пожелтение, задержка роста и, наконец, смерть наступает через 10-14 дней после применения.

ТЕФЛОН-50%: наиболее эффективен в соответствующих условиях. Борьба с сорняками зависит от вида, времени применения и условий выращивания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	СОРНЯК	НОРМА РАСХОДА	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Картофель	Однолетние и широколистные сорняки	35 - 225 г / 1000 м ² 27 - 45 г / 20 л вода	До появления всходов и после посадки (не менее 5 см в глубину), но до появления урожая.
Морковь, петрушка	Однолетние и широколистные сорняки	90 - 180 г / 1000 м ² 18 - 36 г / 20 л вода	До появления всходов и после посадки (не менее 1 см в глубину), но до появления урожая. После появления 4 или более полностью развитых стадий истинного листа.

ВНИМАНИЕ: Использовать только на вышеупомянутых культурах.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед использованием провести калибровку распылительного оборудования.
- **ТЕФЛОН-50%** может снизить эффективность в сухих условиях. Почва должна быть влажной. Избегайте неравномерного распределения по картофельным рядам и не распылять в ветреную погоду; не применять, на влажной листве или когда дождь неизбежен.
- Использовать на всех типах почв, кроме очень легких почв и песков. Остаточное действие будет снижено на болотных и торфяных почвах. На этих почвах требуется использовать более высокие дозы, так как **ТЕФЛОН-50%** адсорбируется на органическом веществе. Важно убедиться, что грядки прочные, с комками не больше размера кулака.
- 4 месяца - период ожидания перед посадкой растений на обработанной территории.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных 3 месяцев с момента последней обработки территории.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Желательно не смешивать с другими пестицидами.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.