

# TRIVAP-75% ТРИВАП-75%

Класс:  
Триазины

## ИНСЕКТИЦИД РЕГУЛЯТОР РОСТА НАСЕКОМЫХ (IGR) СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Регулятор роста насекомых с контактным действием, который мешает линьке и окукливанию. При использовании на растениях он действует как системный инсектицид.

**СОСТАВ:** Каждый кг содержит:

**ЦИРОМАЗИН**

**75% вес / вес (активного вещества)**

### СВОЙСТВА:

**ТРИВАП-75%:** регулятор роста насекомых с контактным действием, который препятствует линьке и окукливанию. При использовании на растениях он действует как системный инсектицид; при нанесении на листья он проявляет сильный трансламинарный эффект, но при нанесении на почву он захватывается корнями и перемещается акропетально.

**ТРИВАП-75%:** не убивает взрослых насекомых, но ограничивает размножение за счет ослабления инкубационного яйца и частичной стерильности яиц.

**ТРИВАП-75%:** используется в качестве листовенного спрея для контроля минеров на овощах: сельдерей, дыни, помидоры, салат, баклажаны, картофель, грибы и декоративные растения.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

| КУЛЬТУРА                                                                                                                                                        | ВРЕДИТЕЛЬ | НОРМА РАСХОДА<br>г/ 20 л ВОДЫ                                                                                                                                | БЕЗОПАСНЫЙ<br>ПЕРИОД                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Открытое поле:<br><br>Кабачок, тыква,<br>фасоль, горох,<br>мускус, арбуз,<br>морковь, лук,<br>баклажаны,<br>картофель,<br>петрушка, салат,<br>перец и помидоры. | Минеры    | 25 - 35<br>Начать<br>опрыскивание при<br>первом появлении<br>заражения 50 л /<br>Донум, и повторное<br>распыление<br>проводить каждые<br>7-10 дней, если это | 3 дня:<br>Помидоры, огурцы,<br>баклажаны, мускус,<br>арбуз, кабачок и<br>тыква. |

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

|                                                                                             |  |             |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Теплицы:</b>                                                                             |  | необходимо. | 14 дней:<br>Бобы, горох, морковь,<br>салат, перец,<br>картофель и лук. |
| <b>Помидор, огурец,<br/>перец, баклажаны,<br/>клубника и<br/>декоративные<br/>растения.</b> |  |             |                                                                        |

Донум = 1000 м<sup>2</sup>.

#### **ВНИМАНИЕ:**

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период до сбора урожая.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

Не наносить этот продукт через систему орошения.

#### **ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:**

24 часа после последнего применения.

#### **СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством известных пестицидов, но смешивание с щелочным соединением (известковая сера и соединения меди) может снизить эффективность препарата.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.