VACOMIL-35%

ВАКОМИЛ-35%

ФУНГИЦИД

Класс:
Ацилаланины

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Системный фунгицид, эффективен в борьбе с грибковыми заболеваниями: плесень, ложная мучнистая роса и почвенные болезни.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

МЕТАЛАКСИЛ

35% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАКОМИЛ 35%: системный фунгицид, эффективный для борьбы с грибковыми заболеваниями на самых разных культурах.

ВАКОМИЛ 35%: используется на многих культурах, таких как: картофель, тыква, лук, чеснок, виноград, клубника, фруктовые деревья, оливки, декоративные растения.

ВАКОМИЛ 35%: Используется в качестве обработки семян для защиты от заболеваний почвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Картофель, помидоры, огурец, тыква, кабачек, арбуз.	Ложная мучнистая роса, фитофтороз	15	7
Лук, чеснок.	Ложная мучнистая роса, гниль, плесень	6 - 12	7
Клубника	Пятнистость листьев, корневая гниль, гниль стеблей	15	15
Виноград	Ложная мучнистая роса	15 - 20	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Абрикос, слива, вишня, персик, миндаль, яблоко, груша.	Пятнистость листьев, курчавость листьев, парша	20	15
Оливки	Листовая пятнистость	8-10	15
Декоративн ые растения	Ложная мучнистая роса	8-10	-----

ВНИМАНИЕ:

- Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.
- Использовать в качестве протравливания семян для борьбы с появляющимися заболеваниями, норма расхода 200 г продукта / 100 кг семян.

ЛЕЧЕНИЕ ЖИДКОЙ СМЕСЬЮ:

Тщательно перемешать соответствующее количество **ВАКОМИЛ 35%** с соответствующим количеством семян и достаточным количеством воды для получения жидкой смеси (в течение 3-5 минут).

СУХАЯ ОБРАБОТКА:

Использовать механический смеситель: 0,5-1 л воды / 100 кг семян, размешивать в течение 1-2 минут, затем добавить соответствующую дозу **ВАКОМИЛ 35%** и снова размешивать в течение 3 минут.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, в состав которых входят щелочные соединения.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.