

VACOMIL-MZ 72% ВАКОМИЛ-МЗ 72%

ФУНГИЦИД

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Класс:
Дитиокарбаматы⁽¹⁾
Ацилаланины⁽²⁾

Эффективный фунгицид с системным и контактным действием для борьбы с широким спектром грибковых заболеваний, таких как гниль и ложная мучнистая роса на разных сельскохозяйственных культурах.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

МАНКОЦЕБ⁽¹⁾

64% вес / вес (активного вещества)

МЕТАЛАКСИЛ⁽²⁾

8% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАКОМИЛ-МЗ 72%: защищает растение на стадии роста, Металлаксил проникает через ткань растения, в то время как Манкозепб защищает вне ткани.

ВАКОМИЛ-МЗ 72%: Контролируйте широкий спектр грибковых заболеваний на разных сельскохозяйственных культурах.

ВАКОМИЛ-МЗ 72%: оказывает немедленное воздействие на плесень и ложную мучнистую росу на винограде, помидорах, картофеле, луке и других культурах, упомянутых ниже в таблице, ранняя плесень и фитофтороз на томате, картофеле и листовая пятнистость.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА г/20 л ВОДЫ	ВРЕМЯ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ	ВНИМАНИЕ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры (открытый грунт)	70	7 дней	Обрабатывать 3 раза в течение периода роста: первое применение проводить при появлении первых симптомов и после в течение активного периода роста. Пока растение растет и зреет, использовать дополнительно еще один распространенный	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

			фунгицид через 7 дней после последнего применения ВАКОМИЛ-МЗ 72%.	
Картофель	50	7 дней	3 раза в течение активного периода роста, еще один фунгицид можно использовать через 7 дней после последнего применения ВАКОМИЛ-МЗ 72%.	14
Лук	50	7 дней	Обработку проводить 3 раза максимум, первое применение - до появления первых симптомов заболевания.	10
Дыня, кабачок	50	14 дней	---	4
Салат	50	14 дней	---	7
Перец	50 – 60	21 день	---	7
Виноград	50	10 дней	Обрабатывать максимум четыре раза: 1. Когда высота растения составляет 20-25 см. 2. До стадии цветения через 14 дней после первого применения. 3. В конце периода цветения. 4. Через 14 дней на стадии цветения предпочтительно использовать другие обычные фунгициды (через 7 дней после последнего применения ВАКОМИЛ-МЗ 72%.)	14
Фруктовые деревья	140	Первое применение весной, а второе - осенью после сбора урожая	Ширина борозды составляет около 90 см ²	7
Цитрусовые деревья	60 – 120	3 месяца	---	21

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на выше упомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Через 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством известных фунгицидов и инсектицидов.

*** ДРУГАЯ ФОРМА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:**

**VACOMIL-FORTE 58% WP (MANCOZEB 48% + METALAXYL 10%),
PANALAXIL – 72% WP.**

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.