

VACOMIL-PLUS 50%

ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%

ФУНГИЦИД

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Класс:
Ацилаланины ⁽¹⁾
Неорганические
соединения ⁽²⁾

Эффективный системный профилактический и лечебный фунгицид для борьбы с широким спектром грибковых заболеваний, таких как (гниль, ложная мучнистая роса) на широком спектре сельскохозяйственных культур и лекарственных растений.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

МЕТАЛАКСИЛ ⁽¹⁾

15% вес / вес (активного вещества)

ОКСИЛОРИД МЕДИ ⁽²⁾

35% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%: является лечебным и профилактическим фунгицидом; эффективен против широкого спектра грибковых заболеваний, поражающих самые разные сельскохозяйственные культуры.

ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%: не фитотоксичен для обработанных растений, за исключением некоторых видов яблонь.

ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%: Контролирует развитие широкого спектра заболеваний, таких как: ложная мучнистая роса, гниль, пятнистость листьев, парша.

ВАКОМИЛ-ПЛЮС 50%: также используется в качестве протравителя семян для ряда культур.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л воды	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Цветная капуста, кочанная капуста	Ложная мучнистая роса.	30 – 35	14
Арбуз, картофель, мускусная дыня, помидоры	Ранняя гниль, фитофтороз.	30 – 35	14
Яблоня, груша	Ложная мучнистая роса, парша, некроз	30 – 35	21
Персик, абрикос, слива, вишня	Ложная мучнистая роса, парша, некроз	30 – 35	21

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Виноград	Ложная мучнистая роса.	30 – 40	12
Лекарственное растение	Фитофтороз, ложная мучнистая роса.	30	20

ВНИМАНИЕ:

Используется только на вышеупомянутых культурах, соблюдая рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая; некоторые разновидности красных яблок чувствительны к этому продукту. Перед применением необходимо проводить тест на чувствительность.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с пестицидами, но несовместим с соединениями ртути, DNOC, известковой серой и Дитиокарбаматами.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА:**

VACOMIL-PLUS – 76.5% WP

(METALAXYL 15% + COPPER OXYCHLORIDE 61.5% (Cu 35%)).

- **Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.**