

VALETE-80%

ВАЛЕТ-80%

ФУНГИЦИД

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Класс:
Фосфонаты

Системный фунгицид с защитным и лечебным действием для борьбы со многими грибковыми заболеваниями на широком спектре сельскохозяйственных культур, перечисленных в таблице видов использования.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ФОСЕТИЛ АЛЮМИНИЯ

**80% вес / вес
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ВАЛЕТ-80%: является системным фунгицидом с защитным и лечебным действием; поглощается корнями и листьями, перемещается в растении в обоих направлениях.

ВАЛЕТ-80%: ингибирует прорастание спор, блокирует развитие мицелия и споруляции.

ВАЛЕТ-80%: Контролирует количество грибковых заболеваний, которые влияют на сельскохозяйственные культуры.

ВАЛЕТ-80%: имеет длительный остаточный эффект в течение нескольких месяцев на обработанных культурах, не подверженных воздействию дождя и воды; так как пестицид поглощается растительными тканями, то повторное применение минимизируется.

ВАЛЕТ-80%: слегка токсичен для человека и животных, не является фитотоксичным для растений, если используется в соответствии с рекомендациями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	СПОСОБ ОБРАБОТКИ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	ВНИМАНИЕ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД
Груша, яблоко	Красная бактериальная гниль, корневая	Опрыскивание и	50 5 г / м ³	---	2 недели

Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

	гниль (<i>фитофтора</i>)	пропитывание			
Огурцы, арбузы, мускусная дыня, кабачок, тыквы	Ложная мучнистая роса	Опрыскивание	60	Одно опрыскивание каждый месяц	1 неделя
Лук	Ложная мучнистая роса	Опрыскивание	50	Одно опрыскивание каждый месяц	2 недели
Помидоры	Корневая гниль, увядание	Опрыскивание	40	Хорошее опрыскивание покрывает растение	1 неделя
Фруктовые деревья до стадии плодоношени я (нектарины, абрикос, персик, вишня)	Корневая гниль	Опрыскивание и пропитывание	50 5 г /м ³	Одно опрыскивание каждый месяц	2 недели
Виноград	Ложная мучнистая роса	Опрыскивание и пропитывание	37 - 53	-----	30 дней
Кардамон	Ажукальская болезнь, выпревание	Опрыскивание и пропитывание	60 - 80	-----	90 дней
Авокадо	Корневая гниль (<i>фитофтора</i>)	Опрыскивание	74	-----	1 день
Ананас	Гниль сердцевины, Корневая гниль	Опрыскивание и пропитывание	92	-----	1 неделя
Хлопок	Эпидемические болезни	Опрыскивание	28 – 56	-----	-----
Рис	Полосатое высыхание, Пирикуляриоз	Опрыскивание	28	-----	-----
Тобак	Черная стволовая гниль	Опрыскивание	90	-----	-----

Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Кокос	Влажные плоды	Опрыскивание	200	распыления с 3 интервалом в 3 недели, затем проводить одно опрыскивание через каждые 4 недели в течение дождливого сезона	-----
Каучук	Черная полоса	Опрыскивание	288	1 лечение каждые 4 дня в начале сезона дождей	-----
Какао	Черный стручок	Опрыскивание	75	1 лечение каждые 15 дней до и во время сезона дождя	-----
Орхидеи	Черная гниль	Опрыскивание	75	1 лечение каждые 15 дней до и во время сезона дождя	-----
Декоративные растения	Выпревание	Пропитывание	10 г / м ³	Смешать с почвой 400 г / м ²	-----

НИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 12 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Несовместим с соединениями меди, Дикофолом, листовым удобрением и питательным раствором.

Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.