

# VAPCOMIZOLE- 600

## ВАПКОМИЗОЛ - 600

БОЛЮС

Антигельминт применяют против круглых червей у овец, коз,  
крупного рогатого скота, верблюдов



**СОСТАВ:** Каждый болюс содержит:

Тетрамизол HCl

600 мг

### СВОЙСТВА:

- Тетрамизол представляет собой мощный антигельминт широкого спектра действия
- Принадлежит к имидазольной группе.
- Эффективен против нематод (круглых червей) желудочно-кишечного тракта и легочных червей жвачных животных.
- Тетрамизол в терапевтической дозе безопасен даже для беременных животных.
- Оказывает антигельминтное действие, парализуя нематоды. Паралич обусловлен устойчивым мышечным сокращением, которое приводит к нейро-мышечному параличу паразитов.

### ПОКАЗАНИЯ:

Для лечения и контроля паразитарного гастроэнтерита и паразитического бронхита (легочные черви), вызванные круглыми червями (нематодами) у жвачных животных:

- Желудочно-кишечные черви : *Ascaris*, *Nematodiurs*, *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Cooperia*, *Trichouris*, *Chabertia*, *Strongyloides*, *Trichostrongylus*, *Oesophagostomum*, *Bunostomum*.
- Легочные черви: *Dictyocaulus*.

**ДОЗИРОВКА:** (каждый раз давать разовую дозу)

(15 мг активного вещества / кг массы тела).

- **Овцы, козы, крупный рогатый скот, верблюды:**  
Один болюс / 40 кг массы тела.
- **Ягнята, Дети:** Половина болюса / 20 кг массы тела.

### Время выведения препарата:

- Для потребления мяса и яиц: 7 дней.
- Для потребления молока: 2 день.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Безопасно для беременных животных.
- Избегать лечения ослабленных или больных животных.
- Органофосфатные инсектициды являются токсичными при применении в течение (14) дней лечения.
- Иногда у некоторых животных может возникать слюноотделение, легкая диарея и кашель.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °С.

**УПАКОВКА:** 50 боллюсов.