

VARCOR-70%

ВАПКОР-70%

Класс:
Триазиноны

ГЕРБИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Селективный системный гербицид, абсорбируемый корнями и листьями, ингибирует процесс фотосинтеза. Используется до и после появления всходов для борьбы с однолетними широколистными сорняками и травами.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

МЕТРИБУЗИН

70% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАПКОР-70%: используется до и после появления всходов многих трав и широколистных сорняков в картофеле, соевых бобах, помидорах, сахарном тростнике, люцерне, спарже и ячмене.

ВАПКОР-70%: используется для борьбы с труднопроходимыми сорняками в течение всего сезона.

ВАПКОР-70%: обладает остаточной активностью (остается на месте, чтобы контролировать последующее развитие сорняков).

ВАПКОР-70%: активируется в условиях влажности почвы, способствующих прорастанию однолетних сорняков.

ВАПКОР-70%: слегка токсичен для млекопитающих и не токсичен для пчел.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	СОРНЯКИ	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры	- широколистные сорняки: королевская маргаритка, Джонсонова трава, малая крапива, дикая горчица, карликовый цикорий, крупнолистный	- до пересадки. - после пересадки, когда растение стало активно расти, и после прорастания сорняков (10 дней после пересадки). - Опрыскивать поливаемые	10 (легкая почва) 15 (тяжелая почва) 10	42

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	кирказон и т. д.	помидоры через 2–3 дня после полива, затем повторить полив через 10 дней.		
Семенные томаты (высаженные)	- однолетние сорняки: пастушья сумка, обыкновенная песчанка, абиссинская	- после пересадки, когда растение на стадии 4 - 6 листовом.	10	
Картофель	трава, чеснок Эрдела, горец птичий, пырей ползучий, лисохвост щетинистый, однолетний многобородник, коленница и т.д.	До прорастания картофеля.	10 - 15 (легкая почва) 15 - 20 (средняя почва) 20 (тяжелая почва)	42

ВНИМАНИЕ:

- Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдайте рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая.
- Злаки, помидоры, горох, фасоль, морковь можно сажать сразу после сбора обработанного картофеля и помидоров.
- **Нельзя** использовать на крестоцветных, тыквах, салате, подсолнечнике, клубнике, сладком картофеле, табаке, сахарном тростнике и луке.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Распыление следует проводить с помощью пластиковых или стекловолоконных распылителей, после применения необходимо очищать использованный распылитель.
- Перед опрыскиванием провести предварительное увлажнение и первичную вспашку обрабатываемой почвы.
- Избегать распыления песчаной почвы с содержанием органических веществ менее 1%.
- **ВАПКОР-70%** малоэффективен для следующих сорняков: (Бермудская трава, Ореховая трава, Многолетняя ржаная трава, Черный паслен), и неэффективен против однолетних трав, имеющих глубокие корни (вьюнок и черноплодная солома).
- **ВАПКОР-70%** используется только в полевых условиях, в теплицах и закрытом грунте не использовать.
- Не обрабатывать семенные томаты, если растение находится на стадии менее 4 листов.
- Использовать более высокую дозу **ВАПКОР-70%** для картофеля, посаженного в почву с высоким содержанием органических веществ, и самую низкую дозу в почве с низким содержанием органических веществ.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

- Некоторые сорта картофеля чувствительны к **ВАПКОР-70%**, например: (Gerla, Marees Pereer, Blanka), поэтому необходимо использовать самую низкую дозу до прорастания урожая.
- Перед опрыскиванием новых сортов посаженного картофеля провести тест на чувствительность к **ВАПКОР-70%** (проводить тест следует на небольшой обработанной площади).
- Шесть месяцев - это период ожидания для посадки тыкв в обработанной зоне.
- Обработанная площадь должна быть вспахана до посадки зерновых и тыквенных культур.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных на обработанном участке в течение 40 дней.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

12 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством других гербицидов, кроме высококонцентрированных смесей.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.