

VAPRINE-50%

ВАПРИН-50%

Класс:
Триазины

ГЕРБИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Селективный системный гербицид, используемый до и после появления всходов для борьбы с однолетними широколистными сорняками, некоторыми многолетними и однолетними травами.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

АТРАЗИН

50% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАПРИН-50%: селективный системный гербицид, для борьбы с однолетними широколистными сорняками, некоторыми многолетними травами и однолетними травами в кукурузе, сорго и сахарном тростнике.

ВАПРИН-50%: Селективный системный гербицид, всасывается главным образом через корни и листву; перед опрыскиванием полезно орошать почву, так как влажность повышает эффективность гербицида.

ВАПРИН-50%: также используется в качестве неселективного гербицида на необрезанных промышленных землях и на залежных землях.

ВАПРИН-50%: обладает низкой токсичностью для млекопитающих.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА кг/ Га	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Сахарный тростник	4,8 кг в немного песчаной почве. 5,6 кг в иловой почве. 7,2 кг в глинистой почве.	До появления всходов
Кукуруза	3,2 кг в немного песчаной почве. 4,8 кг в иловой почве. 6,4 кг в глинистой почве	До или после появления всходов.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Сорго	2,4 кг в песчаной почве. 4,0 кг в илистой почве.	После появления всходов на стадии трех настоящих листьев.
--------------	---	---

Геутар = 10000 м²

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Развести гербицид, по меньшей мере, 300 л воды / Га.
- Использовать для чувствительных культур, включая большинство овощей, картофель, соя, бобовые и зерновые.
- Если использовать **ВАПРИН-50%** 3,2 кг / Га, другие культурные растения могут быть посажены на обработанных полях через 3-4 месяца.
- Если **ВАПРИН-50%** составит 4,8 кг / га, посевы, исключая кукурузу и сорго, могут быть посажены на обработанных полях в следующий вегетационный период.
- Когда **ВАПРИН-50%** применяется более чем 4,8 кг / Га, следует ожидать более продолжительного периода перед повторной посадкой обработанных полей.
- Не использовать распылитель, загрязненный этим продуктом, для каких-либо целей, если только он не был тщательно очищен угольным порошком, а затем промыт водой и раствором с моющим средством.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС:

Не пасти и не кормить животных на поле, которое недавно обработали пестицидом.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Не допускать повторного проникновения на обработанную поверхность или контакта с обработанными поверхностями до полного высыхания спрея.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством других гербицидов.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**