

ВАРСОМИС-1.8% ВАПКОМИК-1.8%

Класс:
Авермектины

ИНСЕКТИЦИД / АКАРИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Эффективный инсектицид и акарицид, обладающий контактной и кишечной активностью.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

АБАМЕКТИН

1,8% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАПКОМИК-1,8%: Высокоэффективный и длительный контроль всех видов паутинных клещей, клещей Цикламена, галлового клеща, минёров, листоблошки, трипсов, червяков и т.д.; применяют на всех этапах развития сельскохозяйственных культур.

ВАПКОМИК-1,8%: очень активен в течение длительного периода времени, так как в его состав входит изомер авермектина В1а.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА МЛ/ 20 Л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры	Минёр, острица, красный паутинный клещ, галловый клещ.	5 - 7	3 - 7
Огурцы, баклажаны	Минёр, красный паутинный клещ.	5 - 7	3 10
Тыква	Минёр, трипсы, клещи.	20 - 40	3
Перец, сельдерей, дыня, арбуз	Минёр, клещи.	10 - 20	7
Салат	Минёр, клещи.	20 - 40	14
Капуста	капустная моль	40	7
Картошка	Минёры, трипсы, листоблошка, черви.	20	7
Редис	клещи	25	14
Лук, Чеснок	Трипсы, минёры, клещи.	5 - 10	3
Тыква	Минёры	16 - 32	3
Цикорий	клещи	16	7 - 14
Эндивай	клещи	16	28
Клубника	Двупятнистый паутинный клещ, клещ цикламена, красный паутинный клещ.	5 - 7	7
Цитрусовые	минёры, красный паутинный клещ.	10	7
Миндаль	клещи, листоблошка	25	21

• Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА МЛ/ 20 Л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Яблоко, грецкий орех	клещи	25 - 48	21
Груши	клещи	25 - 48	10
Финиковая пальма	клещи	10	10
Авокадо	клещи	15	14
Банан	трипсы	90	-----
Папайя	клещи	6 - 24	14
Ананас	клещи	10 - 40	-----
Хлопок	клещи	10 - 20	7
Рис	клещи	2 - 3 л/Га	3
Декоративные растения	минёры, красный паутинный клещ.	5 - 7	3 - 7

ВНИМАНИЕ:

Используется только на вышеупомянутых культурах с соблюдением рекомендованного периода безопасности перед уборкой урожая.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- * Не распылять на растения более 5 раз в течение одного сезона.
- * Результаты контроля появляются после 3-5 дней распыления, однако эффект продукта появляется сразу после распыления.
- * Количество раствора не должно превышать ВАПКОМИК 110 мл / 1000 м² для овощей и декоративных растений.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

В полевых условиях повторное распыление следует проводить после высыхания препарата на листве, через 24 часов после последнего применения.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ:

Нефитотоксичен, но не распылять его на гвоздики и осоки; токсичен для семечковых при смешивании с Каптановыми соединениями (фунгициды).

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, но перед смешиванием рекомендуется проводить тест на совместимость.

*** ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ И ФОРМА ВЫПУСКА: АВAMEX-1,8% (ЕС, SL), ВАМЕСТIN-1,8% (ЕС, SL), МАYSAMECTIN-1,8% ЕС, VAPCOMIC-2% ЕС W / W.**

• Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.