

## ثيلاسايڊ (محلول للحقن)

### • التركيب:

كل مل يحتوي على:

بوبارفكون 50 ملغم

### • الاستطبابات:

- تستخدم لمعالجة مرض الثيلاريوس (حمى السائل الشرقي, مرض الرواق, الثيلاريوس الاستوائي و الخ.....) في المواشي و الذي تسببه فصائل من ثيلاريا بارفا, ثيلاريا ميوتانز, ثيلاريا اورينتاليس. يؤثر بشكل فعال ضد الطور المنقسم و البيروبلازم لميكروب الثيلاريا, ويمكن استعماله في فترة حضانة المرض أو عند ظهور اعراض المرض.

### • الجرعات و طريقة الاستعمال:

- تعطى عن طريق الحقن بالعضل في عضلات الرقبة.
- الابقار : حقن مرة واحدة, 1 مل لكل 20 كغم من وزن الجسم ( 2.5 ملغم بوبارفكون/ 1 كغم من وزن الحيوان), في الحالات الشديدة قد تتطلب جرعة اضافية بنفس الكمية و يجب اعطاءها خلال 48-72 ساعة بعد الحقنة الاولى.
- يجب ان يتم الحقن في منطقة نظيفة و جافة من الجلد
- يجب ان لا يحقن في الموضع الواحد اكثر من 10 مليلتر

### • التأثيرات الجانبية :

قد يلاحظ ظهور ورم أوديمي موضعي بلا ألم في مكان الحقنة.

### • فترة الأمان :

- لاستهلاك اللحم: 42 يوم
- لاستهلاك الحليب: 48 ساعة

### • احتياطات و تحذيرات:

- الثيلاريوس له تأثير شديد على الجهاز المناعي , لذلك من المستحسن تأجيل التطعيم حتى يتعافى الحيوان
- يجب عدم اعطائه في الوريد أو تحت الجلد

### • التخزين:

- يحفظ في مكان جاف معتم و بدرجة حرارة اقل من 30 °م

للاستعمال البيطري فقط.