

فابكو

المجموعة:
Pyrethroid

سايبوثرين- 25%

مبيد حشري / مبيد زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد حشري بايرثرودي غير جهازي يعمل بالملامسة و عن طريق المعدة لمكافحة العديد من الحشرات على عدد كبير من المحاصيل الزراعية المذكوره بجدول الاستعمال

التركيب : كل لتر يحتوى على :

سايبيرمثرين 25% و/ح (مادة فعالة)

الخواص:

- سايبوثرين-25% : مبيد حشري بايرثرودي متوسط السمية للإنسان والحيوان في ظروف استعماله.
- سايبوثرين-25% : يستعمل على نطاق واسع ويقاوم الديدان القارضة، نطاط الأوراق، الخنفساء البرغوثية، خنفساء الخيار، المن، الذبابة البيضاء، الذبابة البيضاء، يرقات حرشفية الأجنحة والتي تصيب محصول الزهرة، الملفوف، البروكلي، الخس، البصل، الثوم والكرات.
- سايبوثرين-25% : لا يشكل ضرر على النبات إذا استعمل بالنسب الموصى بها.

الاستعمال:

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال مل/ 20 لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
البروكلي، الزهره، الملفوف، الخس.	الديدان القارضة، ديدان البراعم، نطاط الأوراق، الخنفساء البرغوثية، خنفساء الخيار، المن، الذبابة البيضاء، يرقات حرشفية الأجنحة، عثة الظهر الماسي.	10 – 5	7
	الديدان، التريس.	10 – 7	
البصل، الثوم، الكرات	التريس، المن، الديدان، البق.	10 – 7	7

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

تحذير:

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في الملصق مع الالتزام بفترات الأمان أثناء عملية القطف.
- الفترة بين الرش الأخرى يجب ان لا تقل عن 7 أيام.
- في حالة الإصابة الشديدة والمتوسطة يتم استخدام الجرعة الأعلى من المبيد سايبوثرين-25%.
- في حالة الإصابة الخفيفة يتم استخدام الجرعة الأدنى من المبيد سايبوثرين-25%.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور- 48 ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

يمكن خلطه مع معظم المبيدات المعروفة ، وينصح بعمل تجربة خلط مبدئية قبل الرش.

- للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.