

بلاسترون- 20%

مبيد حلم زراعي سام
بودرة قابلة للبلل

مبيد حلم يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي ويمتاز بالقضاء على جميع أطوار الحلم باستثناء مرحلة (الببيض الشتوي).

التركيب : كل كغم يحتوى على :

تريبوفينبايريد 20.0% (و/و) (مادة فعالة)

الخواص:

بلاسترون – 20%: مبيد حلم فعال في القضاء على الحلم الأحمر على أشجار الفاكهة والقضاء على الحلم الأحمر ذو النقطتين على محصول الفراولة ونباتات الزينة.

بلاسترون – 20%: يمنع تطور الحلم وخصوصاً خلال مرحلة وضع البيوض على الجانب السفلي للأوراق.

بلاسترون – 20%: يعمل على مكافحة جميع أطوار الحلم باستثناء مرحلة "الببيض الشتوي".

الاستعمالات:

المحصول	الأمراض	نسبة الاستعمال 20/ لتر ماء	موعد الرش	فترة الأمان
التفاح، الأجاص	الحلم الأحمر، حلم صدأ التفاح	10 غم	يجب ألا يتم تطبيق المبيد قبل سقوط البتلات بنسبة 90% حجم محلول الرش 250 إلى 2000 لتر من الماء / هكتار. الجرعة القصوى في السنة هي 500 جم / هكتار.	7 أيام
الفراولة	الحلم الأحمر ذو النقطتين	15 غم	قم بتطبيق المبيد عندما يظهر الحلم وقبل الإصابة الشديدة. لتحقيق أفضل النتائج يجب تغطية سطوح الأوراق العلوية والسفلية بالمبيد. حجم محلول الرش 500 إلى 1500 لتر من الماء / هكتار. الجرعة القصوى في السنة هي 750 جم / هكتار.	3 أيام
نباتات الزينة	الحلم الأحمر ذو النقطتين	10 - 20 غم	قم بتطبيق المبيد عندما يظهر الحلم وقبل الإصابة الشديدة. يجب استخدام المعدل الأعلى في حالة الإصابة الشديدة. يوصى بإجراء اختبار على نطاق صغير لأي نوع من أنواع الورد في جميع مراحل المحاصيل قبل استخدامه لإثبات قدرته على تحمل ظروف الاستخدام. الجرعة القصوى في السنة هي 6000 جم / هكتار	---

تحذير: يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل القطف.

قابلية الخط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ويفضل عمل تجربة خلط مصغرة قبل البدء بعملية الرش.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يمنع دخول الحقل المعامل قبل مرور 48 ساعة من المعاملة.

- للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.