



VAPCO
VETERINARY & AGRICULTURAL
PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.



PLASTRON-20% WP
ПЛАСТРОН-20% СП

Класс:

Пиразолы

АКАРИЦИД
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

ВВЕДЕНИЕ:

ИНСЕКТОАКАРИЦИД, ОБЛАДАЕТ КОНТАКНО-КИШЕЧНЫМ И СИСТЕМНЫМ ДЕЙСТВИЕМ; ВЫСОКО ЭФФЕКТИВЕН В БОРЬБЕ С КЛЕЩАМИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ИХ РАЗВИТИЯ.

СОСТАВ: КАЖДЫЙ КГ СОДЕРЖИТ:

ТЕБУФЕНПИРАД

20,0% вес/вес
(активного вещества)

СВОЙСТВА:

ПЛАСТРОН - 20% СП: АКАРИЦИД, ВЫСОКО ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ КРАСНЫХ ПАУТИННЫХ КЛЕЩЕЙ (ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ) И ДВУПЯТНИСТЫХ ПАУТИННЫХ КЛЕЩЕЙ (КЛУБНИКА И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ).

ПЛАСТРОН - 20% СП: ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ ЯИЦ КЛЕЩЕЙ, ОТЛОЖЕННЫХ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ЛИСТА РАСТЕНИЯ.

ПЛАСТРОН - 20% СП: ВЫСОКО ЭФФЕКТИВЕН В БОРЬБЕ С КЛЕЩАМИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ИХ РАЗВИТИЯ, ОТ ЯЙЦА ДО ВЗРОСЛОЙ ОСОБИ (КРОМЕ ЗИМНИХ ЯИЦ)



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА г/ 20 л ВОДЫ	ПРИМЕЧАНИЕ	ПЕРИОД РАСПАДА (ДНИ)
ЯБЛОКО И ГРУША	КРАСНЫЙ ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ, ГАЛЛОВЫЕ КЛЕЩИ.	10	ОБРАБАТЫВАТЬ НЕОБХОДИМО ДО МОМЕНТА ДО 90% ПАДЕНИЯ ЛИСТВЫ. РАСПЫЛЯТЬ В ОБЪЕМЕ 250-2000 л ВОДЫ / Га. МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЗА В ГОД - 500 г / Га	7
КЛУБНИКА	ДВУПЯТНИСТЫЙ ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ.	15	ПРИМЕНЯТЬ ПЛАСТРОН ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НА УРОЖАЕ ПЕРВОГО ПАУТИННОГО КЛЕЩА, И ДО УКРЕПЛЕНИЯ ЭФФЕКТА. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТЬЕВ. ОБЪЕМ РАСПЫЛЕНИЯ 500 - 1500 л ВОДЫ / Га. МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЗА В ГОД - 750 г / Га	3
ДЕКОРАТИ ВНЫЕ РАСТЕНИЯ	ДВУПЯТНИСТЫЙ ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ.	10 - 20	ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПЕРВОМ ПОЯВЛЕНИИ КЛЕЩЕЙ. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ВРЕДИТЕЛЕЙ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ СЛЕДУЕТ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ПРЕПАРАТОМ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЕ НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ ПРОИЗРАСТАНИЯ КУЛЬТУРЫ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЗА В ГОД - 6000 г / Га.	--



VAPCO

VETERINARY & AGRICULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.



ВНИМАНИЕ:

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ КУЛЬТУРАХ С СОБЛЮДЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАННОГО СРОКА ОЖИДАНИЯ ПЕРЕД УБОРКОЙ УРОЖАЯ.
- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ТЕСТ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ УРОЖАЯ.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

УСТОЙЧИВОСТЬ УРОЖАЯ:

НЕ ФИТОТОКСЕН ПРИ СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ КУЛЬТУРЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ УРОЖАЯ.

МАЛОМАСШТАБНОЕ ИСПЫТАНИЕ ЛЮБОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НА ВСЕХ УРОЖАЯХ ЭТАПОВ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ЕГО ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СОВМЕСТИМОСТЬ: СОВМЕСТИМ С БОЛЬШИНСТВОМ ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТЕСТ НА СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ.