



VAPCO
VETERINARY & AGRICULTURAL
PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.



RIMANIL-40% SC
РИМАНИЛ-40% КЭ
ФУНГИЦИД
КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ВВЕДЕНИЕ:

КОНТАКТНО-СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД; БЫСТРО ПРОНИКАЕТ В КУТИКУЛУ ЛИСТА И ДОСТИГАЕТ РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ПОДАВЛЯЕТ РАЗВИТИЕ ГРИБКОВ И ПРОРАСТАНИЕ СПОР.

СОСТАВ: КАЖДЫЙ ЛИТР СОДЕРЖИТ:

ПИРИМЕТАНИЛ

40,0% ВЕС / ОБЪЕМ

(АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА)

СВОЙСТВА:

РИМАНИЛ-40% КЭ: СИСТЕМНЫЕ ФУНГИЦИД, БЫСТРО ПРОНИКАЕТ В КУТИКУЛУ ЛИСТА И ДОСТИГАЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПОДАВЛЯЕТ РАЗВИТИЕ ГРИБОВ И ПРОРАСТАНИЕ СПОР.

РИМАНИЛ-40% КЭ: МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ТЕПЛИЦАХ С ТОМАТАМИ.



ПРИМЕНЕНИЕ И НОРМЫ РАСХОДА:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл/20 л ВОДЫ	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД
МИНДАЛЬ ФИСТАШКИ	БУРАЯ ГНИЛЬ, ФИТОФТОРОЗ СОЦВЕТИЙ, ЗЕЛЕНАЯ ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ	21-40 мл	- НАЧАТЬ ОБРАБОТКУ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ СРЕДЫ СПОСОБСТВУЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ. -ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 7 ДНЕЙ	30 дней
	ДЫРЧАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, МАКРОСПОРИОЗ, БОТРИОСФЕРИЯ, ГНИЛЬ, АНТРАКНОЗ, ПАРША	40 мл 21 мл ПРИ СМЕШИВАНИИ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ	- СЛЕДУЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ЦВЕТЕНИЯ И ПЕРЕД СБОРОМ УРОЖАЯ. - НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЗА 7 ДНЕЙ ДО СБОРА УРОЖАЯ	
ВИНОГРАД	СЕРАЯ ГНИЛЬ	40 мл 21 мл ПРИ СМЕШИВАНИИ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ	- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПОКРЫТИЯ СОЦВЕТИЙ И ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ - РАСПЫЛЯТЬ ПРИ РАННЕМ ЦВЕТЕНИИ, В	14 ДНЕЙ



			ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ И ДО СБОРА УРОЖАЯ	
АБРИКОС НЕКТАРИН ПЕРСИК СЛИВА (НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ВИШНЯХ)	БУРАЯ ГНИЛЬ, ФИТОФТОРОЗ СОЦВЕТИЙ	21-40 мл	- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИШНИ.	14 дней
	ДЫРЧАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, ПАРША, СЕРАЯ ПЛЕСЕНЬ	40 мл 21 мл ПРИ СМЕШИВАНИИ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ	- НАЧАТЬ ОБРАБОТКУ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ СРЕДЫ СПОСОБСТВУЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ. - НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ БОЛЕЕ ТРЕХ РАЗ; ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОБРАБОТКАМИ НЕ МЕНЕЕ 7 ДНЕЙ - ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПОЛНОМ ЦВЕТЕНИИ ИЛИ НА СТАДИИ ПАДЕНИЯ ЛЕПЕСТКОВ - ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ ДО СБОРА УРОЖАЯ	
ЯБЛОКО, ГРУША, МУШМУЛА ЯПОНСКАЯ, АЙВА	ПАРША	15-22 мл 10 мл ПРИ СМЕШИВАНИИ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ	- НАЧАТЬ ОБРАБОТКУ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ - ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОБРАБОТКАМИ НЕ МЕНЕЕ 7 ДНЕЙ	72 дней



ПОМИДОРЫ	АЛЬТЕРНАРИОЗ, СЕРАЯ ГНИЛЬ	15 мл	- НАЧАТЬ ОБРАБОТКУ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ СРЕДЫ СПОСОБСТВУЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ. - ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ 7-14 ДНЕЙ - ТЕПЛИЦЫ: ОБРАБОТКУ ПРОВОДИТЬ В ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ИЛИ СТЕКЛЯННЫХ ТЕПЛИЦАХ. ВЕНТИЛЯЦИЯ ТЕПЛИЦЫ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ: ПРОВОДИТЬ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ	7 дней
КАРТОФЕЛЬ СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ ИМБИРЬ	АЛЬТЕРНАРИОЗ	40 мл 21 мл ПРИ СМЕШИВАНИИ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ	- НАЧАТЬ ОБРАБОТКУ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ СРЕДЫ СПОСОБСТВУЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ. - ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ 7-14 ДНЕЙ	7 дней



ЛУК ЧЕСНОК ЛУК-ПОРЕЙ	БОТРИТИС ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТОВАЯ, ШЕЙКОВАЯ ГНИЛЬ, ПУРПУРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ	40 мл 21 мл ПРИ СМЕШИВАНИИ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ	- НАЧАТЬ ОБРАБОТКУ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ СРЕДЫ СПОСОБСТВУЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ. - ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ 7-14 ДНЕЙ	7 дней
ФАСОЛЬ ГОРОХ	БОТРИТИС СЕРАЯ ГНИЛЬ	30-40 мл / 20 л ВОДЫ (600-1500) л РАСТВОРА / Га)	-----	7 ДНЕЙ
КЛУБНИКА	СЕРАЯ ГНИЛЬ	40 мл 21 мл ПРИ СМЕШИВАНИИ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ	ПРИМЕНЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ВЕГЕТАЦИИ (ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ И ДО СБОРА УРОЖАЯ), С ИНТЕРВАЛОМ 7 -14 ДНЕЙ.	7 ДНЕЙ

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ВЫШЕ УПОМЯНУТЫХ КУЛЬТУРАХ И СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕД УБОРКОЙ УРОЖАЯ.

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИШНИ.

- ДОБАВЬТЕ ПОЛОВИНУ ОТ ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ В БАК И НАЧАТЬ ПЕРЕМЕШИВАТЬ, ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ДОБАВИТЬ РИМАНИЛ-40% КЭ, И УЖЕ ПОСЛЕ ВЛИТЬ ОСТАВШЕЕСЯ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ (НЕ ПРЕРЫВАЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕШИВАНИЯ).



VAPCO

VETERINARY & AGRICULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.



ТОЛЕРАНТНОСТЬ:

В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МОЖЕТ БЫТЬ ФИТОТОКСИЧНЫМ НА $\geq 80\%$, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ ПРОВЕТРИВАНИЯ НА НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУРАХ (ЛИСТОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ).

СОВМЕСТИМОСТЬ:

ПРЕПАРАТ СОВМЕСТИМ С БОЛЬШИНСТВОМ ФУНГИЦИДОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ САРТАН-50% WP), ГЕРБИЦИДОВ И ИНСЕКТИЦИДОВ, А ТАК ЖЕ ВНЕКОРНЕВЫМИ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА ХИМИЧЕСКУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

12 ЧАСОВ ОТ ПОСЛЕДНЕГО РАСПЫЛЕНИЯ; ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ВИНОГРАД: 24 ЧАСА.

Действие на вредные организмы: Пириметанил обладает защитным, системными и трансламинарными действиями; отличается исключительными свойствами перераспределяться в растении путем газовой фазы - на поверхности листа, включая необработанные участки; внутри листа - благодаря трансламинарным свойствам. Обеспечивает высокую эффективность против возбудителей болезней, в частности парши, в ранние сроки даже при прохладной погоде. Контролирует инфекцию на протяжении 72 ч после проникновения (лечебный эффект).

Механизм действия: Пириметанил быстро проникает в кутикулу и обладает трансламинарными свойствами. Он ингибирует секрецию грибковых энзимов, которые требуются для инфицирования, и в результате, угнетает прорастание мицелия.

Подавляемые вредные объекты: яблоня, груша: парша, мучнистая роса; виноград: оидиум, серая гниль; земляника: серая гниль; картофель: альтернариоз; томат открытого и защищенного грунта: альтернариоз, серая гниль.

Применение: Препараты на основе пириметанила следует применять в период вегетации. Количество обработок зависит от культуры, в среднем от 2 до 4 раз, средний интервал 10-14 дней.



VAPCO

VETERINARY & AGRICULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.



Токсикологические характеристики: Пириметанил имеет умеренную токсичность для крыс. Пириметанил не относится к группе компонентов, которые выявляют нейротоксическое действие. Метаболизм пириметанила идёт более медленно в плодах и корнях растений, однако значимое количество метаболитов обнаруживается в зелёных листьях некоторых растений. В полевых условиях ДТ₅₀ пириметанила составляет 7-54 дня. В воде не образуется каких-либо значимых метаболитов. Пириметанил не является высоколетучим веществом.

Совместимость с другими препаратами: Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.

Фитотоксичность: В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен по отношению к обрабатываемым культурам.

Период защитного действия: Биологический эффект продолжается в течение 10-14 дней в зависимости от погодных условий и степени инфицирования.

Скорость воздействия: В течение нескольких часов с момента обработки.