

آينيو - 10%

مبيد حشري مركز معلق

مبيد حشري جهازى يعمل بشكل رئيسى بواسطة المعدة وله تأثير بالملامسة, يعمل على التأثير على أطوار البيض و اليرقات مع تأثيرات اصفية على خصوبة الأطوار البالغة ويستخدم لمكافحة الحشرات على أشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل الأخرى الواردة في جدول الاستعمال.

التركيب : كل لتر يحتوى على :

سبيروتترامات 10 % و/ ح (مادة فعالة)

الخواص:

- آينيو- 10% : مبيد جهازى, ينتقل خلال الخشب واللحاء الى جميع الانسجة النباتية بمل في ذلك النموات الجديدة والأوراق والجذور.
- آينيو- 10% : يعمل المبيد عن طريق المعدة ويؤثر على الأطوار الغير بالغة كالبيوض واليرقات كما يئثر على خصوبة الأطوار البالغة من إناث الحشرات كالدبابة البيضاء والمن.

الاستعمالات:

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال 20 / لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
الجريب فروت, الليمون, المندرين, البرتقال, البوملي	المنّ, الذبابة البيضاء, البق, البسبيل, الحشرات القشرية, التربس	35.5 – 28.3	21
العنب, الكيوي	البق الدقيقي, فيلوكسرا العنب, الذبابة البيضاء	28.3 – 17.7	14
التفاح, اسكندنيا, السفرجل, الاجاص	المنّ, بسبيل الاجاص, البق الدقيقي, الذبابة البيضاء	31.9 – 21.1	21
المشمش, الكرز, الخوخ, البرقوق	المنّ, بسبيل الاجاص, البق الدقيقي, الذبابة البيضاء	31.9 – 21.1	21
اللوز , الكاجو , الكستناء, الجوز البندق, الفستق	البق الدقيقي, فيلوكسرا, المنّ, الذبابة البيضاء	31.9 – 21.1	21

21	35.5 – 28.3	البق الدقيقي, الحشرات القشرية, المنّ الذبابة البيضاء	الأفوكادو ، الجوافة ، مانجو ، البابايا
14	17.8 – 10.6	المنّ, البسيلا الذبابة البيضاء	البامية، الباذنجان البامية ، الفلفل، البندورة.
14	17.8 – 10.6	يرقات الديدان القارضة,	الكرفس ، الخس الهقدونس ، السبانخ
14	17.8 – 10.6	المنّ, الذبابة البيضاء	الحمص, البازلاء, الترمس ، الفاصوليا ، اللوبيا, العدس.
14	17.8 – 10.6	المنّ, الذبابة البيضاء	البروكلي, الملفوف, الزهرة
14	17.8 – 14.8	المنّ, البسيلا الذبابة البيضاء	الخرشوف الزنجبيل ، البطاطا ، والبطاطا الحلوة ، الكرم

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الملصقة مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف.
- لا يستعمل المبيد في فترة سقوط البتلات على أشجار الفاكهة.
- لا يستحب خلط المبيد في تنك الرش مع كل من المبيدات التالية "زيوت الرش بالاضافة الى الكابتان و الكبريت"
- لا يستعمل المبيد في البيوت الزجاجية أو البيوت البلاستيكية.
- يجب البدء برش المبيد عند بداية ظهور الآفات وقبل زيادة أعدادها.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور 24 ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة, إلا أنه ينصح بإجراء تجربة على نطاق ضيق قبل الخلط مع أي مبيد للمرة الأولى.

- للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.