

فا بكو

المجموعة:
anilinopyrimidine

ريمانيل - 40%

مبيد فطري
مركز معلق

مبيد فطري جهازي يخرق اوراق النبات ويتغلغل ليصل الى الأنسجة النباتية ليثبط عمل الفطريات ونمو الأبواغ.

التركيب : كل كغم يحتوى على :

بايريميثانيل 40% و/ ح (مادة فعالة)

الخواص:

ريمانيل-40% : مبيد فطري جهازي يخرق اوراق النبات ويتغلغل ليصل الى الأنسجة النباتية ليثبط عمل الفطريات ونمو الأبواغ.

ريمانيل-40%

يمكن استخدامه داخل البيوت البلاستيكية على محصول البندورة فقط.

الاستعمالات:

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	فترة الأمان (أيام)	ملاحظات
العنب	العفن الرمادي	40 21 عند الخلط مع المبيدات الأخرى	14	• استخدم كمية مناسبة من الماء عند الخلط مع المبيد وذلك لضمان التغطية الكاملة ووصول المبيد الى الأوراق والأزهار بشكل جيد. • تبدأ أول معاملة للمبيد في بداية الازهار أو /و مرحلة انتفاخ الثمار والتصاقها ببعض ، وفي بداية نضج الثمار وتلونها ثم مرحلة ما قبل الحصاد.

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

● لا يستخدم على أشجار الكرز ● يبدأ الرش عندما تكون الظروف ملائمة لنمو الفطريات. ● لا يرش المبيد أكثر من 3 مرات خلال الموسم ويعاد الرش بعد 7 أيام على الأقل عند اللزوم. ● يتم الرش في مرحلة الازهار او تساقط البتلات. ● يجب الرش قبل الحصاد مع مراعاة فترة الامان.	14	40-21	العفن البني ،لفحة الأزهار	المشمش، النكترين، الخوخ والبرقوق
		40 21 عند الخلط مع المبيدات الأخرى	تثقب الأوراق، الجرب، والعفن الرمادي	(لا يستخدم على أشجار الكرز)
● يبدأ الرش عندما تكون الظروف ملائمة لنمو الفطريات ويعاد الرش بعد 7-14 يوم على الأقل عند اللزوم. ● يسمح باستخدام المبيد في البيوت البلاستيكية والزجاجية ولكن بشرط تهوية البيوت مدة ساعتين بعد الرش.	7	15	اللفحة المبكرة العفن الرمادي	البندورة
● يبدأ الرش عندما تكون الظروف ملائمة لنمو الفطريات ويعاد الرش بعد 7-14 يوم على الأقل عند اللزوم.	7	15	اللفحة المبكرة	البطاطا البطاطا الحلوة
● يبدأ الرش عندما تكون الظروف ملائمة لنمو الفطريات ويعاد الرش بعد 7-14 يوم على الأقل عند اللزوم.	7	40 21 عند الخلط مع المبيدات الأخرى	لفحة الأوراق ، عفن الرقبة و التلطيخ الأرجواني	البصل الثوم والكرات
● يبدأ الرش قبل الازهار الى ما قبل الحصاد ويعاد الرش بعد 7-14 يوم على الأقل عند اللزوم.	7	40 21 عند الخلط مع المبيدات الأخرى	العفن الرمادي	الفراولة

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الملصقة مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف.
- لضمان الخلط الجيد تضاف نصف كمية الماء الى خزان الرش ومن ثم كمية المبيد ويحرك جيدا، ومن ثم تضاف باقي كمية الماء مع الاستمرار بالتحريك قبل وخلال عملية الرش.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

- يمنع دخول الحقل المعامل قبل مرور 24 ساعة من المعاملة لأشجار العنب.
- يمنع دخول الحقل المعامل قبل مرور 12 ساعة من المعاملة لباقي المحاصيل.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات والأسمدة الورقية ما عدا الكابتان-50% WP ويفضل عمل تجربة خلط مصغرة قبل البدء بعملية الرش.

- للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.