

فابكو

المجموعة:  
Semicarbazone

# ميتافاب-24%

## مبيد حشري مركز معلق

مبيد حشري له تأثير معوي , فعال لمكافحة صانعة الأنفاق (توتا أبسولوتا) في محصول البندورة  
وفعال لمكافحة الحشرات المذكورة في جدول الاستعمال.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

ميتافلوميـزون 24 % و / ح (مادة فعالة)

الخواص:

- ميتافاب-24% : يحتوي على المادة الفعالة ميتافلوميـزون والتي تعمل على غلق قنوات الصوديوم.  
ميتافاب-24% : يعمل المبيد عن طريق المعدة بعد تغذية الحشرات على اجزاء النبات المعاملة بالمبيد حيث تتوقف الحشرات عن التغذية ثم تصاب بالشلل والموت خلال 1 الى 72 ساعة

الاستعمالات:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال لكل لتر ماء	موعد الرش	عدد مرات الرش للموسم	فترة الامان
البندورة (البيوت البلاستيكية)	يرقات الديدان القارضة , يرقات صانعة الانفاق	20 مل	يتم الرش في مرحلة اليرقات عند بداية نمو النبات.	2	7
البندورة (الحقول المفتوحة)	يرقات الديدان القارضة , يرقات صانعة الانفاق	20 – 15 مل	في حالة الإصابة الشديدة ، كرر الرش بعد 7 - 10 أيام.	2	7
البانجان (الحقول المفتوحة)	يرقات الديدان القارضة	28 – 14 مل		2	7

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

7	2		18 – 11 مل	يرقات الديدان القارضة، فراشة الملفوف	الملفوف
3	2		25 – 18 مل	يرقات الديدان القارضة	الخس
7	2	يرش عندما تضع الحشرة بيوضها قبل الفقس	20 مل	يرقات الديدان القارضة	الفلفل (البيوت البلاستيكية)

#### تحذير:

لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الملصقة مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف.  
للتقليل من احتمال ظهور المقاومة لحشرة توتا ايسلوتا يوصى بتناوب المبيد ميتافاب مع المبيدات الأخرى التي لا تحتوي المادة الفعالة ميتافلوميرون.

#### فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور 24 ساعة على آخر معاملة.

#### قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلوية منها، إلا أنه ينصح بإجراء تجربة على نطاق ضيق قبل الخلط مع أي مبيد للمرة الأولى.