

فابكو

المجموعة:
avermectin

فابكومك برو – 50.4%

مبيد حلم/ حشري
مركز معلق

مبيد حلم وحشري غير جهازى يعمل عن طريق الملامسة وله تأثير طويل الامد.

التركيب : كل لتر يحتوى على :

48.0% و/ح (مادة فعالة)
2.4% و/ح (مادة فعالة)

بيفينازيت
ابامكتين

الخواص:

- فابكومك-برو 50.4% : مبيد ذو تركيبة فريدة من المادتين الفعالتين (ابامكتين وبيفينازيت) وله تأثير باللامسة.
- فابكومك-برو 50.4% : خليط من مادتين فعاليتين ذو طريقة عمل مختلفتان مما يجعله ذو تأثير على جميع اطوار الحلم والحشرات.
- فابكومك-برو 50.4% : يستخدم لمكافحة الحلم ذو البقعتين، حلم البراعم، الحلم الأوروبي الأحمر، حلم الصدا وصانعات الانفاق.

الاستعمالات:

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / 20 لتر ماء	موعد الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
نباتات الزينة	الحلم ذو البقعتين، حلم البراعم، الحلم الأوروبي الأحمر، حلم الصدا. صانعات الانفاق.	6 - 9 مل	- يرش المبيد عند بداية ظهور الإصابة. - في حال الإصابة	----
اشجار الفاكهة قبل مرحلة العقد	الحلم ذو البقعتين، حلم البراعم، الحلم الأوروبي الأحمر، حلم الصدا. صانعات الانفاق.	5- 6 مل 9 مل	الشديدة يتم تكرار الرش بعد 7 ايام من الرشة الاولى. - يستخدم فقط	---
المشاتل: نباتات الاشجار الحرجية والاشجار الصنوبرية واشجار المناظر الطبيعية	الحلم ذو البقعتين، حلم البراعم، الحلم الأوروبي الأحمر، حلم الصدا. صانعات الانفاق.	5- 6 مل 9 مل	مرتين بالموسم.	---

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الملصقة مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف.
- قد يسبب حروق للتفاحيات عند خلطة مع مركب الكابتان.
- لا يستخدم في مشاتل الحمضيات.
- لا يطبق عن طريق المرشات الجوية، ولا عن طريق انظمة الري.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور 24 ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

قابل للمزج مع معظم المبيدات باستثناء مركبات الكابتان، ولكن ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل خلط المبيد.