

سبايروجكت

وسائل للحقن

التركيب : كل مل يحتوي على:
سبايراميسين

600000 وحدة دولية

الخصائص:

- سبايراميسين مضاد حيوي من مجموعة الماكروليدات. وهو مضاد للبكتيريا (مثبط) وفي حالة استخدامه بتراكيز عالية يصبح قاتل لها. طريقة عمله تشبه بقية الماكروليدات: إنها تمنع بناء الببتايد في البكتيريا عن طريق التدخل في تكوين الحمض النووي الريبي.
- سبايراميسين فعال ضد البكتيريا إيجابية الجرام والمايكوبلازما ، وكذلك بعض الجراثيم سالبة الجرام ، وخاصة الفيلقيات والأكتينوباسيلوس.
- للسبايراميسين فعالية ضد المكورات العنقودية والعقدية والنيسريا ومكورات الليستيريا وكوراينباكتريم والمايكوبلازما والكلوستريديوم والباكتيريديس والهيموفيليس و التريبونيم والليبتوسبايرا و التوكسوبلازما و المياغاوانيلة و البروسيلة والباستوريبلا والركتسيا والأميبا .

دواعي الإستعمال:

للأبقار : الوقاية والعلاج من الالتهابات الرئوية ، الالتهابات المعوية ، التهاب الضرع ، التهاب الرحم ، التهاب السرة و التهاب الوريد السري ، التهاب المفاصل ، وتعفن القدم.

الجرعات وطريقة الإستعمال:

حقن عن طريق العضل
العجول: 5 مل سبايروجكت / 40 كجم وزن حي ، جرعة واحدة أو كجرتين يفصل بينها 24 ساعة (75000 وحدة دولية لكل كجم وزن حي)
الأبقار: 5 مل سبايروجكت / 100 كجم وزن حي ، جرعة واحدة أو كجرتين يفصل بينها 24 ساعة (30000 وحدة دولية لكل كجم وزن حي)
يجب ان لا يحقن الموضع الواحد بأكثر من 15 مل.

موانع الاستخدام :

لا يستعمل للحيوانات التي تعاني من حساسية للماكروليدات.

فترة السحب :

- اللحم: 21 يوماً
- الحليب: 7 أيام أو 14 حلبة

التخزين:

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (50، 100) مل.