

FLUNIXIVAR

ФЛУНИКСИВАП

Раствор для инъекций
Для лошадей и крупного рогатого скота

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

СОСТАВ:

Каждый мл содержит:

Флуниксин меглумин (флуниксин) 50 мг.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Лошади: ФЛУНИКСИВАП рекомендуется для облегчения воспаления и боли, связанных с нарушениями опорно-двигательного аппарата у лошади, а также для облегчения висцеральной боли, связанной с коликами.

Крупный рогатый скот: ФЛУНИКСИВАП рекомендуется в качестве жаропонижающего средства при острых воспалительных заболеваниях крупного рогатого скота.

ДОЗИРОВКА:

Лошади :

Для опорно-двигательного аппарата:

- 1,1 мг на кг (1 мл / 45 кг) массы тела один раз в день.
- Лечение можно проводить путем внутривенной или внутримышечной инъекции и повторять в течение пяти дней.

Для облегчения боли, связанной с коликами у лошадей:

- 1,1 мг на кг массы тела. Для быстрого облегчения рекомендуется внутривенное введение. Лечение можно повторить при повторном появлении признаков колик.

Крупный рогатый скот: 2,2 мг / кг (2 мл / 45 кг) массы тела в качестве жаропонижающего средства при острых воспалительных заболеваниях крупного рогатого скота. Рекомендуется внутривенное введение. Важно определить причину острого воспалительного процесса и начать соответствующее лечение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Противопоказания к применению этого препарата по назначению отсутствуют. Следует избегать внутриартериальных инъекций крупному рогатому скоту и лошадям. У лошадей могут наблюдаться побочные реакции при случайном

введении препарата внутриаrтериально . Признаками могут быть атаксия, нарушение координации движений, гипервентиляция, истерия и мышечная слабость. Побочная реакция временна и пропадает без приема антидотных препаратов в течение нескольких минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед инъекцией не смешивайте ФЛУНИКСИВАП раствор с другими лекарствами.

СРОК ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

Молоко: не обнаружено.

Мясо: через 10 дней после последней обработки.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом месте при температуре ниже 30 ° C.

Только для ветеринаров.