

LEVOTRIL ЛЕВОТРИЛ

Водорастворимый порошок и кормовая
добавка

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

ЛЕВОФЛОКСАЦИНА ПОЛУГИДРАТ

100 мг

СВОЙСТВА:

- **Левифлоксацин** - фторхинолоновый антибиотик третьего поколения.
- Он в два раза активнее своего изомера офлоксацина, эффективен против ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий путем ингибирования их ДНК-гиразы или фермента топоизомеразы IV; особенно эффективен против организмов, вызывающих *атипичную пневмонию*. Левифлоксацин - один из так называемых респираторных хинолонов.
- Левифлоксацин следует рассматривать как последнее спасительное средство, когда все другие антибиотики не помогли.
- Фторхинолоны не изменяют анаэробную флору желудочно-кишечного тракта, поэтому нарушение популяции кишечных бактерий минимально.

ПОКАЗАНИЯ:

- **Левотрил** показан при следующих бактериальных инфекциях у домашней птицы, крупного рогатого скота, лошадей, свиньи:
 - Пневмония;
 - Острый бактериальный синусит;
 - Острый и хронический бронхит;
 - Кожные инфекции;
 - При энтерите, желтой и белой дизентерии, перикардите, воспалении яичников, сенная палочка, стафилококковой инфекции и т. д.;
 - Инфекции мочевыводящих путей;
 - Острый пиелонефрит.

ДОЗИРОВКА:

Домашняя птица (курица, утка, гусь):

1 грамм на 1-2 литра питьевой воды в течение 5-7 дней.

Или 500 грамм на 1 тонну кормового материала в течение 5-7 дней.

Лошади и крупный рогатый скот:

Перорально 20-40 мг на килограмм массы тела в течение 3-5 дней.

Свиньи:

1 грамм на 1-2 литра питьевой воды в течение 5-7 дней.

Или 1 килограмм на 1 тонну кормового материала в течение 5-7 дней.

СРОК ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для мяса: через 12 часов после последней обработки.
- При употреблении яиц: 14 дней с момента последней обработки.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре ниже 30 °С.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.