

ЛИНКО – СПЕКТО ЛИНКО-СПЕКТО

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

СОСТАВ:

Каждый мл содержит:

Линкомицин (Линкомицин гидрохлорид)	50 мг
--	--------------

Спектиномицин (Спектиномицина сульфат)	100 мг
---	---------------

ПОКАЗАНИЯ:

ЛИНКО-СПЕКТО эффективен против инфекций, вызванных микроорганизмами, чувствительными к Линкомицину и Спектиномицину.

Он показан для лечения многих респираторных инфекций (сопровождающихся осложнениями, вызванными микоплазмами или без них) и желудочно-кишечных инфекций у телят, овец, коз, домашних птиц, собак и кошек; его применяют при дизентерии, гниении копыт у овец и коз; болезнь Ньюкасла (сопровождающихся осложнениями, вызванными кишечной палочкой или без нее) у домашней птицы и индеек.

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для внутримышечного или подкожного введения.

- Телята, овцы, козы: 1 мл на 10 кг массы тела в день в течение 3-7 дней.
- Собаки, кошки: 1 мл на 5 кг массы тела в день, максимум 3 дня.
- Домашняя птица, индейки: 0,2 мл на кг массы тела в день, максимум 3 дня.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Не давать животным с гиперчувствительностью к Линкомицину или Спектиномицину.
- Не давать животным с нарушениями кроветворения или тяжелыми нарушениями функции печени.
- Не давать кроликам, лошадям и жвачным животным с активной микрофлорой рубца и кишечника.
- Не использовать для лечения несушек, производящих яйца для потребления человеком, или животным в период лактации, если молоко предназначено для потребления человеком.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Вскоре после инъекции может возникнуть легкая боль или зуд.

СРОК ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

Мясо: 14 дней

Почки и печень: 21 день

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом темном месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: 100 мл, 50 мл