

# LINCO-SPECTO ЛИНКО-СПЕКТО

Водорастворимый порошок

## VAPCO АНТИБИОТИКИ

**СОСТАВ:** Каждые 150 г содержат:

Линкомицин	33,3 г
Спектиномицин	66,7 г

### ПОКАЗАНИЯ:

**ЦЫПЛЯТА:** Для увеличения скорости набора массы тела, для профилактики и лечения хронических респираторных заболеваний (аэросаккулитов), вызванных *Mycoplasma spp* и комплекс хронических респираторных заболеваний (осложненный аэросаккулит), связанных с микоплазменными и колиформными инфекциями, чувствительными к Линкомицину и / или Спектиномицину.

**ИНДЕЙКА:** Для использования у индюшат в возрасте до 5 дней для профилактики и лечения аэросаккулита, вызванного *Mycoplasma meleagridis*, чувствительных к Линкомицину и / или Спектиномицину.

### ДОЗИРОВКА:

#### • ЦЫПЛЯТА:

\* ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (аэросаккулита) И КОМПЛЕКСА ХРОНИЧЕСКИХ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ (осложненного аэросаккулита):

Вводить с питьевой водой из расчета 0,5 г антибиотической активности на литр.

Обеспечить как единственный источник воды в течение трех дней.

Важно начать лечение при первых признаках заболевания.

\* ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА ВЕСА:

Вводить 50 мг антибиотика на килограмм массы тела в день с питьевой водой в течение первых пяти-семи дней жизни.

\* ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (аэросаккулит) И КОМПЛЕКСА ХЗБ (осложненного аэросаккулита):

Вводить 150 мг антибиотика на 1 кг массы тела в день с питьевой водой в течение первых трех-пяти дней жизни и 50 мг антибиотика на 1 кг массы тела в день в течение одного-двух дней в возрасте примерно четырех недель или во время вакцинации.

#### • ИНДЕЙКА:

\* ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ АЭРОСАКУЛИТА

Давать 150 мг антибиотика на 1 кг массы тела в день с питьевой водой в течение первых трех-пяти дней жизни.

**СРОК ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:**

Для мяса: за 2 дня до убоя.

**ВНИМАНИЕ:**

- Если в течение трех-пяти дней улучшения не наблюдается, провести повторное обследование (проверить диагноз).
- Не позволять цыплятам и индюшатам других видов получать доступ к питьевой воде с лекарственными препаратами.

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в сухом темном месте при температуре ниже 30 °С.

**УПАКОВКА: 150 г.**