

Melodone

Мелодон

Раствор для инъекций

VARCO
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

МЕЛОКСИКАМ

20 мг

ПОКАЗАНИЯ:

Крупный рогатый скот: применять при острой респираторной инфекции с соответствующей антибактериальной терапией для уменьшения клинических симптомов, при диарее в сочетании с пероральной регидратационной терапией для уменьшения клинических симптомов у телят в возрасте старше одной недели и молодняка, не лактирующего крупного рогатого скота, как дополнительная терапия при лечении острого мастита в сочетании с антибактериальной терапией.

Лошади: применять для облегчения воспаления и облегчения боли при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательной системы, а так же для облегчения боли при коликах.

ДОЗИРОВКА:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ:

однократная подкожная или внутривенная инъекция.

0,5 мг мелоксикама / кг массы тела (2,5 мл / 100 кг массы тела) в сочетании с терапией антибиотиками или пероральной регидратационной терапией, в зависимости от ситуации.

ЛОШАДИ: однократная внутривенная инъекция.

0,6 мг мелоксикама / кг массы тела (3 мл / 100 кг массы тела).

Пероральная суспензия Мелодона 15 мг / мл может использоваться для продолжения лечения в дозе 0,6 мг мелоксикама / кг массы тела через 24 часа после введения инъекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Не использовать в следующих случаях:
 - Для лошадей младше 6 недель.
 - Для крупного рогатого скота младше одной недели для лечения диареи.
 - Для беременных или кормящих кобыл.
 - У животных, страдающих нарушениями функции печени, сердца или почек и геморрагическими заболеваниями, или при наличии признаков ulcerогенных поражений желудочно-кишечного тракта.
 - В случае гиперчувствительности к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- У крупного рогатого скота может возникать временная опухоль в месте инъекции, которая проходит без вмешательства.
- У лошадей могут возникать анафилактические реакции, и их следует лечить симптоматически.
- Не применять одновременно с глюкокортикостероидами, другими нестероидными противовоспалительными препаратами или антикоагулянтами.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

Крупный рогатый скот: мясо: 15 суток.
Для потребления молока: 5 дней.

Лошади: мясо: 5 дней.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом месте при температуре не выше 30 ° C.

УПАКОВКА: 50 мл, 100 мл.