

SPIROJECT СПИРОЖЕКТ

Раствор для инъекций

VARCO
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

СОСТАВ:

Каждый мл содержит:

СПИРАМИЦИН

600 000 МЕ

СВОЙСТВА:

- Спирамицин - антибиотик группы макролидов. Он обладает бактериостатическим и бактерицидным действием в высоких концентрациях. Его механизм действия аналогичен макролидам: он подавляет синтез пептидов путем диссоциации комплекса РНК во время транслокации.
- Спирамицин эффективен против грамположительных бактерий и микоплазм, а также некоторых грамотрицательных микробов, особенно Legionella и Actinobacillus.
- Активен в отношении Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria intracellularis, Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma spp., Clostridium spp., Bacteroides p. Leptospira ictero-hemorrhagiae, Toxoplasma, Miyagawanella, Brucella, Pasteurella, Rickettsia spp. и Amoeba spp.

ПОКАЗАНИЯ:

Крупный рогатый скот: профилактика и лечение легочных инфекций, гастроэнтерита, мастита, метрита, омфалита и омфалофлебита, артрита и гнили стопы.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутримышечный путь

Телята: 5 мл СПИРОЖЕКТА / 40 кг массы тела в виде однократной инъекции или 2 введения с интервалом 24 часа (75 000 МЕ спирамицина / кг массы тела)

Крупный рогатый скот: 5 мл СПИРОЖЕКТА на 100 кг массы тела в виде однократной инъекции или 2 введения с интервалом 24 часа (30 000 МЕ спирамицина / кг массы тела)

Не вводить более 15 мл в одно место инъекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не проводить лечение животным с повышенной чувствительностью к макролидам.

СРОКИ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Мясо: 21 день
- Молоко: 7 дней или 14 доек.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: 50 мл, 100 мл.